

**Zasady oceny,
ustalania i orzekania
trwałego uszczerbku
na zdrowiu**

dla lekarzy
z Grupy Ergo Hestia

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| Wprowadzenie | 3 |
| Część ogólna | 4 |
| Część szczegółowa | 5 |
| Określenie procentu trwałego uszczerbku na zdrowiu | 6 |
| A. Uszkodzenia głowy | 10 |
| B. Uszkodzenia twarzy | 16 |
| C. Uszkodzenia narządu wzroku | 19 |
| D. Uszkodzenia narządu słuchu | 22 |
| E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku. | 24 |
| F. Uszkodzenia klatki piersiowej i jej następstwa | 25 |
| G. Uszkodzenia brzucha i ich następstwa | 28 |
| H. Uszkodzenia narządów moczopłciowych | 30 |
| I. Ostre zatrucia i ich następstwa. (należy orzekać nie wcześniej niż po 6 miesiącach) | 32 |
| J. Uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego | 32 |
| K. Uszkodzenia miednicy | 36 |
| L. Uszkodzenia kończyny górnej | 37 |
| M. Uszkodzenia kończyny dolnej | 54 |
| N. Porażenia lub niedowładny poszczególnych nerwów obwodowych | 69 |

ZASADY OCENY, USTALANIA I ORZEKANIA TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU DLA LEKARZY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GRUPĄ ERGO HESTIA

WPROWADZENIE

Pojęcia kluczowe:

- nieszczęśliwy wypadek
- przyczyna zewnętrzna
- nagłość zdarzenia
- niezależność od woli Ubezpieczonego/Poszkodowanego
- związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem, a skutkami
- trwałe uszczerbek na zdrowiu.

Za **nieszczęśliwy wypadek** uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną w następstwie, którego Ubezpieczony/Poszkodowany niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Zdarzenie, które nastąpiło **bez przyczyny zewnętrznej** nie jest nieszczęśliwym wypadkiem. Stany chorobowe nawet nagłe, spowodowane procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu nie kwalifikują się do uznania za nieszczęśliwy wypadek chyba, że są objęte dodatkowym rodzajem ubezpieczenia (np. zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu).

Nagłość zdarzenia w zasadzie oznacza jednorazowy moment działania czynnika zewnętrznego, lecz w pewnych okolicznościach uznane za nagłe może być działanie czynnika przez czas dłuższy.

Niezależność od woli Ubezpieczonego/Poszkodowanego oznacza, że samookaleczenia lub samobójstwa nie są w tym pojęciu wypadkami ubezpieczeniowymi. Są nim natomiast efekty nawet rażących zaniedbań lub lekkomyślności, gdyż Ubezpieczony/Poszkodowany nie zamierzał spowodować śmierci lub utraty swojego zdrowia.

Związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem uznawanym za nieszczęśliwy wypadek, a efektami w postaci rozstroju zdrowia lub śmierci jest jedną z najistotniejszych przesłanek dla uznania uszczerbku jako kwalifikującego się do świadczeń z tytułu ubezpieczenia.

Pojęcie **trwały uszczerbek** obejmuje wszelkiego rodzaju utrwalone dolegliwości, ubytki morfologiczne i zaburzenia budowy oraz zaburzenia czynności, zmniejszenie sprawności i wydolności narządów i układów, powstałe w następstwie (wyłącznie) nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego odpowiedzialnością przez spółki Grupy Ergo Hestia. Uszkodzenie ciała powodujące powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu wymagać może leczenia i powodować może powstanie czasowej niezdolności do pracy. Trwałemu uszczerbkowi nie musi towarzyszyć trwała niezdolność do pracy. Przy ustalaniu trwałego uszczerbku na zdrowiu bierzemy pod uwagę jedynie biologiczne uszkodzenie organizmu, nie bierzemy natomiast pod uwagę zawodu i wcześniejszych umiejętności Ubezpieczonego/Poszkodowanego. Trwały uszczerbek może wynosić od 0 do 100%.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Ustalen trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze orzekający – jednoosobowo lub w zespole (komisji) powołani przez osoby upoważnione przez spółki Grupy Ergo Hestia. Czynią to w formie końcowego lub wstępnego orzeczenia lekarskiego.
2. Lekarze orzekający ustalają stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz związek przyczynowy z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym odpowiedzialnością Towarzystwa.
3. Lekarz orzekający wydaje orzeczenie na podstawie:
 - a) osobistego badania Ubezpieczonego/Poszkodowanego,
 - b) dokumentacji dotyczącej wypadku i dokumentacji medycznej.
4. W przypadku konieczności przeprowadzenia u Ubezpieczonego/Poszkodowanego specjalistycznych badań diagnostycznych, bądź konieczności uzyskania innych niezbędnych do wydania orzeczenia informacji, lekarz może zawiesić ocenę wysokości uszczerbku na zdrowiu do czasu uzyskania przez jednostkę zlecającą potrzebnych materiałów.
5. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu winna być ustalana niezwłocznie po rzeczywistym zakończeniu leczenia i ew. po zakończeniu zleconej przez lekarza rehabilitacji. W przypadku przedłużającego się leczenia musi to nastąpić najpóźniej w 24 miesiącu po wypadku.
6. O ile ciężkość lub charakter wypadku sprawia, że można przewidywać przedłużanie się leczenia ponad 6 miesięcy lekarz orzekający winien wydać orzeczenie wstępne i w orzeczeniu tym określić:
 - a) przypuszczalne, minimalne kalectwo, zakładając optymalny przebieg leczenia i rehabilitacji,
 - b) przewidywany termin badania końcowego.
7. W ocenie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu odpowiednią pozycję tabeli należy dostosować do ocenianych w sposób obiektywny dolegliwości ubytków morfologicznych, zaburzeń czynności, zmniejszenia sprawności uszkodzonych narządów i układów.
8. Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w tabeli procentowej należy ocenić "per analogiam" – "przez podobieństwo" wg pozycji najbardziej zbliżonej merytorycznie, zaznaczając to w orzeczeniu.
9. W przypadku utraty lub uszkodzenia narządu, lub układu czynnościowego, których funkcja już przed wypadkiem była zaburzona, wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu pomniejsza się o stopień kalectwa istniejący przed wypadkiem.
10. Uszczerbek istniejący przed wypadkiem należy brać pod uwagę, ale tylko w oparciu o:
 - a) uprzednio wydane orzeczenie lekarskie,
 - b) stwierdzenie ewidentnego ubytku kończyny lub funkcji,
 - c) szacunek różnicy pomiędzy istniejącymi przed wypadkiem ewidentnymi zmianami np. zwyrodnieniowymi, a następstwami, które wynikają z wypadku pogarszającego stan wynikający z wcześniejszej choroby/kalectwa.
11. W przypadku wielomiejscowych uszkodzeń kończyny suma procentowa uszczerbku za poszczególne uszkodzenia nie może przekraczać wysokości uszczerbku przewidzianej w tabeli za utratę tej części kończyny.
12. Jeżeli w następstwie wypadku doszło do uszkodzenia więcej niż jednej kończyny lub narządu łączny stopień trwałego uszczerbku może maksymalnie wynosić 100%.
13. U osób leworęcznych uszkodzenie kończyny górnej ocenia się wg pozycji tabeli dla kończyny górnej prawej, zaś kończyny prawej jak dla lewej.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Nawykowe zwichnięcie barku ocenia się jednorazowo – tylko za wypadek, który spowodował powstanie nawyku zwichnięcia.
2. Podwójne widzenie, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wymagające przy pracy przesłonięcia jednego oka, powoduje uszczerbek na zdrowiu odpowiadający ślepotcie jednego oka.
3. Pourazowe lub związane przyczynowo z urazem uszkodzenie powłok brzusznych powodujące powstanie przepukliny pourazowej stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu (w odróżnieniu od innych rodzajów przepuklin).
4. W przypadku rozszerzonych wariantów ubezpieczenia lekarz dodatkowo potwierdza:
 - a) fakt zaistnienia czasowej niezdolności do pracy i jej bezpośredni związek ze zdarzeniem wywołującym trwały uszczerbek na zdrowiu i/lub,
 - b) zasadność poniesionych przez Ubezpieczonego/Poszkodowanego kosztów: badań diagnostycznych, jednorazowego zaopatrzenia ortopedycznego lub stomatologicznego, rehabilitacji oraz innych działań zmierzających do zmniejszenia następstw nieszczęśliwego wypadku.
5. Następstwa zawalotów serca orzeka się oceniając stopień niewydolności krążenia analogicznie do uszkodzeń serca lub osierdzia.
6. Następstwa udarów mózgu orzeka się zgodnie z uszczerbkiem odpowiadającym następstwom urazów czaszkowo-mózgowych.

OKREŚLENIE PROCENTU TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

Każdy uszczerbek opisywany jest alfanumerycznie: Liczba-litera-liczba np. 114 A 2. Jeżeli uszczerbek zostaje przypisany do opisu: np. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub z nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne.

| 114 | | Złamanie trzonu kości ramiennej – w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym | P | L |
|-----|---|--|---|---|
| | A | niewielkie zmiany | | |
| | 1 | złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne | 2 | 1 |
| | 2 | złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne | 4 | 2 |

114 – złamanie trzonu kości ramiennej – w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym
 A – niewielkie zmiany (przemieszczenia, ograniczenia)
 2 – złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne
 Oznaczeniu uszczerbku przypisujemy odpowiedni procent z Tabeli:
 114 A 2 – 4% dla kończyny prawej lub 2% dla kończyny lewej

Jeżeli rozpoznany uszczerbek to:

| 105 | | Uszkodzenie stawu łopatkowo – ramiennego – w zależności od blizn, ograniczeń ruchomości, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń złamanej głowy, nasady bliższej kości ramiennej i innych zmian wtórnych | P | L |
|-----|---|---|----|----|
| | C | dużego stopnia | | |
| | 1 | znaczna deformacja stawu łopatkowo-barkowego całkowite zeszywnienie stawu łopatkowo-barkowego | 20 | 16 |
| | 2 | znaczna deformacja stawu ze znacznymi dolegliwościami, powodującymi duże zaburzenia funkcji zbliżone do zeszywnienia stawu w pozycji czynnościowo niekorzystnej | 24 | 20 |

Uszkodzenie stawu łopatkowo-ramiennego (105), dużego stopnia (105 C) ze znaczną deformacją stawu ze znacznymi dolegliwościami, powodującymi duże zaburzenia funkcji zbliżone do zeszywnienia stawu w pozycji czynnościowo niekorzystnej (105 C 2), ponadto powikłane:

| 111 | A | Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych z przetokami i zmianami neurologicznymi – ocenia się wg. pozycji 105-110, zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od stopnia powikłań i zaburzeń funkcji o | | |
|-----|---|---|---|---|
| | 1 | przewlekłe zapalenie kości | + | 8 |
| | 2 | ciała obce | + | 8 |
| | 3 | przetoki | + | 8 |
| | 4 | zmiany neurologiczne | + | 8 |

przewlekłym zapaleniem kości (111 A 1) i zmianami neurologicznymi (111 A 4), to uszczerbek należy oznaczyć:
 105 C 2 = 24% dla kończyny prawej lub 20% dla kończyny lewej
 111 A 1,4 = 16%
 Całkowity uszczerbek to: 40% dla kończyny prawej lub 36% dla kończyny lewej, oznaczony 105 C 2; 111 A 1,4.

Jeżeli rozpoznany uszczerbek to:

| 95 | | Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe lub mieszane) – w zależności od stopnia | | |
|----|---|--|---|----|
| | C | łędźwiowo-krzyżowe | | |
| | 1 | znaczne zaburzenia czucia | + | 5 |
| | 2 | umiarkowane zaburzenia czucia | + | 3 |
| | 3 | niewielkie zaburzenia czucia | + | 2 |
| | 4 | zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych | + | 10 |
| | 5 | zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych | + | 5 |
| | 6 | zaburzenia ruchu znacznego stopnia | + | 10 |
| | 7 | zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia | + | 5 |
| | 8 | zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia | + | 2 |
| | 9 | osłabienie siły mięśniowej | + | 5 |

Urazowy zespół korzeniowy (95) odcinka lędźwiowego (95 C) z umiarkowanymi zaburzeniami czucia (95 C 2), wymagający stałego przyjmowania środków p/bólowych (95 C 4), z zaburzeniami ruchu umiarkowanego stopnia (95 C 7), to uszczerbek należy oznaczyć:

95 C 2,4,7

i zsumować przypisane % uszczerbku (3+10+5)

95 C 2,4,7 = 18 %.

Jeżeli natomiast rozpoznany uszczerbek to:

| | | | |
|----|---|---|------|
| 67 | | Przetoki jelitowe, kałowe i odbył sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczenia się i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę: | |
| | A | jelita cienkiego | 20 + |
| | 1 | zapalenie tkanek otaczających przetokę | + 10 |
| | 2 | reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę | + 5 |
| | 3 | niedostateczny stan odżywienia | + 20 |
| | 4 | nieregularna wymiana torebek | + 5 |
| | 5 | częsta wymiana torebek | + 5 |
| | 6 | brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny | + 5 |

Pourazowa przetoka (67) jelita cienkiego (67 A) powikłana reakcją uczuleniową tkanek otaczających przetokę (67 A 2), wymagająca częstej wymiany torebek (67 A 5) i wiktana brakiem możliwości utrzymania prawidłowej higieny (67 A 6), to uszczerbek należy oznaczyć:

67 A 2, 5, 6

i zsumować przypisane % uszczerbku: (20+5+5+5)

67 A 2, 5, 6 = 35%.

A. USZKODZENIA GŁOWY

PROCENT
TRWAŁEGO
USZCZERBKU

1. Uszkodzenia powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

A. uszkodzenia powłok czaszki w zależności od rozmiaru, ruchomości i tkliwości blizn

| | |
|--|---|
| 1. < 5 cm średnicy/długości blizny, bez dolegliwości bólowych | 1 |
| 2. < 5 cm średnicy/długości blizny, towarzyszące dolegliwości bólowe | 2 |
| 3. > 5 cm średnicy/długości blizny, bez dolegliwości bólowych | 3 |
| 4. > 5 cm średnicy/długości blizny, towarzyszące dolegliwości bólowe | 4 |

B. oskalpowanie (dla kobiet x 2):

| | |
|---------------------|----|
| 1. < 5 cm średnicy | 5 |
| 2. 5-10 cm średnicy | 8 |
| 3. > 10 cm średnicy | 15 |

2. Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłębienia, szczeliny, fragmentacja) w zależności od rozległości uszkodzeń

A.

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. < 2,5 cm średnicy/długości | 5 |
| 2. 2,5-5 cm średnicy/długości | 7 |
| 3. > 5 cm średnicy /długości | 9 |

3. Ubytek w kościach czaszki

A.

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. < 2,5 cm średnicy/długości | 5 |
| 2. 2,5-5 cm średnicy/długości | 8 |
| 3. 5-8 cm średnicy/długości | 15 |
| 4. > 8 cm średnicy /długości | 20 |

Uwaga: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz.1) należy osobno oceniać stopień uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości wg. Poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki wg. poz. 1.

4. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom w poz. 1, 2 i 3 ocenia się dodatkowo w zależności od rodzaju.

(należy do pozycji podstawowej dodać uszczerbki wynikające z powikłań – max. 25)

A.

| | |
|---|----|
| 1. nawracający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego | +5 |
| 2. przewlekłe zapalenia kości | +5 |
| 3. ropowica podczepcowa leczona operacyjnie | +5 |

| | |
|------------------------|----|
| 4. zakrzepica powłok | +5 |
| 5. przepuklina mózgowa | +5 |

5. Porażenia i niedowłady połowicze:

A.

| | |
|----------------------------------|-----|
| 1. porażenie połowicze utrwalone | 100 |
|----------------------------------|-----|

B. niedowład połowiczny znacznie utrudniający sprawność kończyn z afazją

| | |
|--|-----|
| 1. z afazją całkowitą | 100 |
| 2. z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie | 95 |
| 3. z afazją nieznacznego stopnia | 90 |

C. niedowład połowiczny znacznie utrudniający sprawność kończyn bez afazji

| | |
|--|----|
| 1. prawostronny ze współistniejącą ataksją | 80 |
| 2. prawostronny | 70 |
| 3. lewostronny ze współistniejącą ataksją | 70 |
| 4. lewostronny | 60 |

D. niedowład połowiczny nieznacznego stopnia z afazją

| | |
|--|----|
| 1. z afazją całkowitą | 80 |
| 2. z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie | 70 |
| 3. z afazją nieznacznego stopnia | 60 |

E. niedowład połowiczny nieznacznego stopnia bez afazji

| | |
|-----------------|----|
| 1. prawostronny | 40 |
| 2. lewostronny | 30 |

F. porażenie kończyny górnej, z niedowładem kończyny dolnej

| | |
|--|----|
| 1. prawej – uniemożliwiające samodzielne chodzenie | 80 |
| 2. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej, umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego | 70 |
| 3. prawej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej, umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne | 60 |
| 4. lewej – uniemożliwiające samodzielne chodzenie | 70 |
| 5. lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej, umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego | 60 |
| 6. lewej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej, umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne | 50 |

G. porażenie kończyny dolnej, z niedowładem kończyny górnej

| | |
|---|----|
| 1. prawej, nie poruszający się samodzielnie, znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki | 80 |
| 2. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej | 70 |
| 3. prawej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej | 60 |
| 4. lewej, nie poruszający się samodzielnie, znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki | 70 |
| 5. lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej | 60 |
| 6. lewej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej | 50 |

H. niedowład kończyny górnej (bez niedowładu kończyny dolnej)

| | |
|-----------|----|
| 1. prawej | 40 |
| 2. lewej | 30 |

| | |
|---|-----|
| I. | |
| 1. niedowład kończyny dolnej (bez niedowładu kończyny górnej) | 20 |
| J. | |
| 1.śladowe objawy uszkodzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego | 5 |
| 6. Zespoły pozapiramidowe: | |
| A. | |
| 1. utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich | 100 |
| B. zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy i napadami ocznymi | |
| 1. wymagający stałej opieki osoby trzeciej, wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne | 80 |
| 2. wymagający okresowej opieki osoby trzeciej, wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne | 70 |
| 3. znaczne ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym, obecne zmiany psychiczne i kognitywne | 60 |
| 4. umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi | 40 |
| 5. niewielkie ograniczenia funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi nieznacznego stopnia | 30 |
| C. | |
| 1. zaznaczony zespół pozapiramidowy | 20 |
| 7. Zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego i przedsionkowego: | |
| A. | |
| 1. zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie | 100 |
| B. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie | |
| 1. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie i uniemożliwiające wykonywanie jakiegokolwiek pracy zawodowej, znaczne utrudnienie wykonywania prac domowych | 70 |
| 2. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie, uniemożliwiające wykonywanie pracy zawodowej, jednak z możliwością wykonywania prac domowych | 50 |
| C. | |
| 1. zaburzenia równowagi utrudniające w małym stopniu chodzenie | 20 |
| D. | |
| 1. śladowe zaburzenia równowagi sporadycznie utrudniające chodzenie | 5 |
| 8. Padaczka | |
| A. | |
| 1. padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatią, otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiającymi jakkolwiek pracę | 100 |

| | |
|---|-----|
| B. padaczka z rzadkimi napadami, ale ze zmianami otępiennymi utrudniającymi w dużym stopniu wykonywanie pracy (w zależności od stopnia zaburzeń psychicznych oraz kognitywnych, potwierdzonych leczeniem psychiatrycznym oraz badaniem neuropsychologicznym) | |
| 1. znaczne, postępujące zmiany otępienne, stała opieka osób trzecich | 70 |
| 2. znaczne zmiany otępienne, regularna opieka osób trzecich w ciągu dnia | 60 |
| 3. znaczne zmiany otępienne, okresowa opieka osób trzecich | 50 |
| C. padaczka bez zmian psychicznych z częstymi napadami | |
| 1. częste napady wtórnie uogólnione, co najmniej 2 w miesiącu bez wyraźnej aury | 60 |
| 2. częste napady wtórnie uogólnione, co najmniej 2 w miesiącu z aurą | 50 |
| 3. częste napady padaczkowe częściowe proste i / lub złożone bez wtórnego uogólnienia, sporadycznie wtórnie uogólnione | 40 |
| D. padaczka bez zmian psychicznych z rzadkimi napadami (1 raz i mniej na miesiąc) | |
| 1. politerapia z ew. objawami ubocznymi leczenia przeciwpadaczkowego | 30 |
| 2. politerapia bez objawów ubocznych leczenia przeciwpadaczkowego | 25 |
| 3. monoterapia | 20 |
| 9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie) | |
| A. ciężkie zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy) | |
| 1. ciężkie zaburzenia psychiczne, wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy, częste i długotrwałe hospitalizacje psychiatryczne) | 100 |
| 2. ciężkie zaburzenia psychiczne, wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy, wymagające leczenia ambulatoryjnego oraz okresowo szpitalnego) | 80 |
| 3. ciężkie zaburzenia psychiczne, wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy, wymagające stałego ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego) | 70 |
| B. encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi | |
| 1. znacznego stopnia zmiany otępienne ze zmianami charakterologicznymi wymagające całodobowej opieki osób trzecich | 70 |
| 2. znacznego stopnia zmiany otępienne mające wpływ na całodienne funkcjonowanie wymagające w ciągu dnia pomocy osób trzecich | 50 |
| C. encefalopatie z utrwalonymi skargami subiektywnymi (ból głowy, zawroty głowy, wzmożona pobudliwość nerwowa, trudność w skupieniu uwagi, zaburzenia pamięci, snu itp.) | |
| 1. znacznego stopnia nasilone objawy subiektywne, ograniczające funkcjonowanie w życiu codziennym, wymagające stałego i długotrwałego leczenia, obecne objawy neurologiczne oraz zmiany w badaniu neuropsychologicznym, (wg ICD-10, F07.2) | 30 |
| 2. umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym, obecne zmiany w badaniu neuropsychologicznym i/lub neurologicznym | 20 |
| 3. nieznaczne subiektywne objawy bez zmian w badaniu neurologicznym i neuropsychologicznym | 5 |

| | |
|---|------------|
| 10. Nerwice i zespoły nerwicopodobne: | |
| A. nerwice i zespoły nerwicopodobne po urazie czaszkowo – mózgowym – w zależności od stopnia zaburzeń (pourazowe zaburzenia stresowe PTSD) – wg ICD-10 | |
| 1. znacznego stopnia zaburzenia stresowe z przebiegiem remitującym lub postępującym, wymagające stałego leczenia psychiatrycznego | 20 |
| 2. umiarkowanego stopnia zaburzenia stresowe, leczone przez psychiatrę i/lub psychologa | 10 |
| 3. niewielkiego stopnia zaburzenia stresowe | 4 |
| B. nerwice i zespoły nerwicopodobne po uszkodzeniu ciała – w zależności od stopnia zaburzeń | |
| 1. dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego dłuższego niż 6 miesięcy | 10 |
| 2. dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego krótszego niż 6 miesięcy | 5 |
| 3. dokumentacja leczenia nerwicy przez lekarzy innych specjalności niż psychiatria lub psychologia, przez okres 6 miesięcy | 2 |
| C. | |
| 1. zespół cerebrasteniczny z utrwalonymi skargami subiektywnymi | wg pkt. 9c |

| | |
|--|-----|
| 11. Zaburzenia mowy: | |
| A. afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją | |
| 1. utrzymujące się zmiany, pomimo 12 miesięcznego leczenia logopedycznego | 100 |
| 2. nieznaczna poprawa po leczeniu logopedycznym | 80 |
| B. | |
| 1. afazja całkowita motoryczna | 60 |
| C. afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się | |
| 1. znacznego stopnia nasilone zaburzenia mowy, utrzymujące się pomimo intensywnego, co najmniej 6 miesięcznego leczenia logopedycznego | 60 |
| 2. afazja z rozumieniem symboli językowych z możliwością komunikacji z pomocą mowy lub pisma | 50 |
| 3. umiarkowane trudności rozumienia mowy i / lub mówienia lub pisania | 30 |
| D. | |
| 1. afazja nieznacznej stopnia | 15 |

| | |
|---|-----|
| 12. Zespoły podwzgórzowe pourazowe i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego: | |
| A. | |
| 1. zaburzenia wydzielania hormonów płciowych | +15 |
| 2. zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu (należy oceniać tylko u dzieci i młodzieży) | +15 |
| 3. niedoczynność tarczycy | +10 |
| 4. wtórna niedoczynność kory nadnerczy | +10 |
| 5. moczówka prosta | +10 |

| | |
|---|----|
| 13. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej: | |
| A. nerwu okoruchowego, w zakresie mięśni wewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia (konieczne przeprowadzenie badania okulistycznego) | |
| 1. znaczne | 15 |
| 2. umiarkowane | 8 |
| 3. niewielkie | 3 |
| B. nerwu okoruchowego, w zakresie mięśni zewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia | |
| 1. z podwójnym widzeniem i opadnięciem całkowitym powieki | 30 |
| 2. podwójne widzenie, opadanie powieki | 20 |
| 3. podwójne widzenie, bez opadania powieki | 10 |
| C. | |
| 1. nerwu boczowego | 3 |
| D. nerwu odwodzącego – w zależności od stopnia uszkodzenia (podwójne widzenie, ograniczenie ruchomości) | |
| 1. znaczne | 15 |
| 2. umiarkowane | 8 |
| 3. niewielkie | 3 |

| | |
|--|----|
| 14. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia | |
| A. | |
| 1. przewaga zaburzeń czucia w zakresie pojedynczej gałęzi | 5 |
| B. | |
| 1. przewaga zaburzeń czucia w zakresie wszystkich gał. jednostronne | 10 |
| C. przewaga dolegliwości bólowych w zależności od stopnia nasilenia bólu | |
| 1. wymagające regularnego przyjmowania środków przeciwbólowych | 20 |
| 2. wymagające sporadycznego przyjmowania środków przeciwbólowych | 10 |

| | |
|--|----|
| 15. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego – w zależności od stopnia uszkodzenia. | |
| Poszczególne gałęzie: | |
| A. | |
| 1. pierwsza | 15 |
| 2. druga lub trzecia | 8 |
| 3. całkowite | 20 |

| | |
|---|----|
| 16. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy i oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego | |
| A. | |
| 1. całkowite porażenie podniebienia, gardła i krtani | 50 |
| B. porażenie nerwu krtaniowego wstecznego | |
| 1. jednostronne | 8 |
| 2. obustronne | 30 |

| | |
|--|----|
| C. porażenie nerwu językowo-gardłowego, w zależności od trudności połykania | |
| 1. znaczne | 25 |
| 2. umiarkowane | 15 |
| 3. niewielkie | 10 |

| | |
|--|----|
| D. | |
| 1. neuralgia nerwu językowo-gardłowego | 20 |

17. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego
– w zależności od stopnia uszkodzenia

| | |
|---|----|
| A. | |
| 1. całkowite, obejmujące mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz górną część mięśnia czworobocznego | 15 |
| 2. częściowe | 5 |

18. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego
– w zależności od stopnia uszkodzenia

| | |
|--|----|
| A. | |
| 1. całkowite z obecnością faskykulacji i zaników | 20 |
| B. częściowe | |
| 1. znacznego stopnia | 10 |
| 2. niewielkiego stopnia | 5 |

B. USZKODZENIA TWARZY

19. Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):

| | |
|--|----|
| A. oszpecenia bez zaburzeń funkcji (dla kobiet x 2) | |
| 1. blizna, przewaga zmiany pigmentacji skóry (do 3 cm średnicy) | 2 |
| 2. blizna, przewaga zmiany pigmentacji skóry (powyżej 3 cm średnicy) | 5 |
| 3. wyraźne, szpeczące blizny do 3 cm długości/średnicy | 8 |
| 4. wyraźne, szpeczące blizny powyżej 3 cm długości/średnicy | 10 |

B. oszpecenie z miernymi zaburzeniami funkcji (należy sumować poszczególne rodzaje uszkodzeń, ale nie więcej niż 30)

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. blizny i ubytki | +10 |
| 2. zaburzenia przyjmowania pokarmów | +8 |
| 3. zaburzenia artykulacji | +8 |
| 4. ślinotok | +5 |
| 5. zaburzenia funkcji powiek | +5 |
| 6. zaburzenia czucia | +5 |
| 7. dolegliwości bólowe | +8 |

C. oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji wymagającymi stosowania przyrządów pomocniczych do naprawy przynajmniej jednej funkcji (należy sumować poszczególne rodzaje zaburzeń, ale nie więcej niż 60)

| | |
|---|-----|
| 1. blizny i ubytki | +10 |
| 2. zaburzenia przyjmowania pokarmów | +15 |
| 3. zaburzenia oddychania i/lub powonienia | +15 |
| 4. zaburzenia artykulacji | +15 |
| 5. ślinotok | +8 |
| 6. zaburzenia funkcji powiek | +8 |

20. Uszkodzenia nosa:

| | |
|---|---|
| A. | |
| 1. niewielkie uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia (przebarwienia i blizny nie zmieniające kształtu nosa) (dla kobiet x 2) | 1 |

B. uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia (zmieniające kształt nosa) (dla kobiet x 2)

| | |
|---|---|
| 1. w niewielkim stopniu | 2 |
| 2. w znacznym stopniu | 3 |
| 3. utrzymujące się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej | 5 |

C. uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania – zależnie od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania

| | |
|---|----|
| 1. nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa | 5 |
| 2. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa | 10 |
| 3. znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa z wtórnym zapaleniem zatok | 20 |

D. uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu

| | |
|--|----|
| 1. nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia | 10 |
| 2. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia | 15 |
| 3. znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa, wtórne zapalenie zatok i zaburzenia powonienia | 25 |

E.

| | |
|--|---|
| 1. utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego | 5 |
|--|---|

F.

| | |
|--|----|
| 1. utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) | 30 |
|--|----|

Uwaga: Jeżeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych poz. 19, należy stosować ocenę według tej pozycji (tj. według poz. 19).

21. Utrata zębów (za każdy ząb):

| | |
|--------------------------|-----|
| A. siekacze i kły | |
| 1. częściowa | 1.5 |
| 2. całkowita | 3 |

B. pozostałe zęby

| | |
|--------------|---|
| 1. częściowa | 1 |
| 2. całkowita | 2 |

22. Złamanie szczęki lub żuchwy – w zależności od przemieszczeń, niesymetrii zgryzu, upośledzenia żucia i rozwierania szczęk powodujące zaburzenia funkcji:

A.

| | |
|------------------------|---|
| 1. nieznaczego stopnia | 5 |
|------------------------|---|

B.

| | |
|----------------------|----|
| 1. średniego stopnia | 10 |
|----------------------|----|

C. znacznego stopnia

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. przemieszczenia | +5 |
| 2. upośledzenie żucia | +5 |
| 3. niesymetria zgryzu | +5 |
| 4. zaburzenia rozwierania szczęk | +5 |

23. Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów

– w zależności od ubytków, oszpecenia i powikłań:

A.

| | |
|--|---------|
| 1. częściowa (należy oceniać według pozycji 19 i 21 nie więcej niż 40) | max. 40 |
| 2. całkowita | 50 |

24. Ubytek podniebienia:

A.

| | |
|--|----|
| 1. z niewielkimi zaburzeniami mowy i/lub połykania | 15 |
| 2. z dużymi zaburzeniami mowy lub połykania | 25 |
| 3. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania | 40 |

25. Ubytki języka:

A.

| | |
|--|----|
| 1. bez zaburzeń mowy i połykania | 3 |
| 2. z niewielkimi zaburzeniami mowy | 10 |
| 3. ze średnio nasilonymi zaburzeniami mowy i połykania | 25 |
| 4. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania | 35 |
| 5. całkowita utrata języka | 50 |

C. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU

26. Obniżenie ostrości wzroku bądź utrata jednego lub obojga oczu:

A.

1. uszczerbek określa się na podstawie tabeli ostrości wzroku

| Ostrość wzroku oka prawego | 1,0 (10/10) | 0,9 (9/10) | 0,8 (8/10) | 0,7 (7/10) | 0,6 (6/10) | 0,5 (1/2) | 0,4 (4/10) | 0,3 (3/10) | 0,2 (2/10) | 0,1 (1/10) | |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|
| Ostrość wzroku oka lewego | Procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu | | | | | | | | | | |
| 1,0 (10/10) | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 0,9 (9/10) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0,8 (8/10) | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 0,7 (7/10) | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 0,6 (6/10) | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0,5 (1/2) | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 0,4 (4/10) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 0,3 (3/10) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 0,2 (2/10) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 0,1 (1/10) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |

Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego

B.

1. Utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej 38

27. Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł korekcyjnych

lub soczewek kontaktowych:

A.

| | |
|----------------|----|
| 1. jednego oka | 15 |
| 2. obojga oczu | 30 |

28. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:

A.

| | |
|---|-----------|
| 1. rozdarcie naczyńówki jednego oka | (poz.26A) |
| 2. zapalenie naczyńówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia | (poz.26A) |
| 3. urazowe uszkodzenia plamki żółtej jednego oka | (poz.26A) |
| 4. zanik nerwu wzrokowego | (poz.26A) |

29. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drążących:

A.

| | |
|---|-----------|
| 1. blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) | (poz.26A) |
| 2. zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki) | (poz.26A) |

| | |
|--|--------------|
| 3. ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku | 10+(poz.26A) |
| 4. ciało obce wewnątrzgałkowe nie powodujące obniżenia ostrości wzroku | 10 |

30. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.)

A.

1. (poz.26A)

31. Koncentryczne zwężenie pola widzenia

A. oceniać należy według tabeli oceny pola widzenia

1. (poz. 31A)

| Zwężenie do | Przy nienaruszonym drugim oku | W obu oczach | Przy ślepotcie drugiego oka |
|-------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 60° | 0 | 0 | 35 |
| 50° | 5 | 15 | 45 |
| 40° | 10 | 25 | 55 |
| 30° | 15 | 50 | 70 |
| 20° | 20 | 80 | 85 |
| 10° | 25 | 90 | 95 |
| poniżej 10° | 35 | 95 | 100 |

32. Połowicze niedowidzenia:

A.

| | |
|-----------------|----|
| 1. dwuskroniowe | 60 |
| 2. dwunosowe | 30 |
| 3. jednoimienne | 25 |

33. Bezsoczekowość po operacyjnym usunięciu zaćmy urazowej

A.

| | |
|-----------------|----|
| 1. w jednym oku | 25 |
| 2. w obu oczach | 40 |

34. Utrata soczewki

A. oceniać należy według poz.26A

| | |
|-----------------|---------|
| 1. w jednym oku | min. 15 |
| 2. w obu oczach | min. 30 |

35. Zaburzenia drożności przewodów łzowych (łzawienie):

A.

| | |
|-----------------|----|
| 1. w jednym oku | 8 |
| 2. w obu oczach | 12 |

36. Odwarstwienie siatkówki jednego oka

A. oceniać należy według poz. 26A i poz. 31A

1. min.15-max 35

37. Jaskra

A. oceniać według tabeli ostrości wzroku wg. poz.26A i poz. 31A

| | |
|-----------------|----------|
| 1. w jednym oku | max. 35 |
| 2. w obu oczach | max. 100 |

38. Wytrzeszcz tętniący,

A. uszczerbek powinien zawierać się w zakresie od 50 do 100

| | |
|---|------------|
| 1. wytrzeszcz | +15 |
| 2. ocena widzenia | (poz. 26A) |
| 3. podwójne widzenie | +15 |
| 4. bóle głowy lub szum w głowie | +15 |
| 5. ciężka keratopatia z niedomykalności | +20 |

39. Zaćma urazowa

A.

1. (poz.26A)

40. Przewlekłe zapalenie spojówek

A

1. 8

D. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU

41. Upośledzenie ostrości słuchu

A.

1. Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się według tabeli 41A

| Ucho prawe \ Ucho lewe | Stuch normalny | Nieznaczne upośledzenie | Średnie upośledzenie | Duże upośledzenie | Upośledzenie graniczące z głuchotą | Głuchota zupełna |
|--|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|
| W nawiasach podano stopień upośledzenia | (0%) | (30%) | (50%) | (70%) | (90%) | (100%) |
| PROCENT TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU | | | | | | |
| Stuch normalny (0%) | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 |
| Nieznaczne upośledzenie (30%) | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 |
| Średnie upośledzenie (50%) | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| Duże upośledzenie (70%) | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Upośledzenie graniczące z głuchotą (90%) | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Głuchota zupełna (100%) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |

Uwaga: W celu wykluczenia agrawacji lub symulacji ostrość słuchu powinno określać się badaniem audiometrycznym i badaniem stroikami.

42. Urazy małżowiny usznej:

A.

| | |
|---|----|
| 1. utrata części małżowiny lub zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) | 5 |
| 2. utrata jednej małżowiny | 15 |
| 3. utrata obu małżowin | 25 |

43. Pourazowe zwężenie lub zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego jednostronne lub obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu

A.

| | |
|----|------------|
| 1. | (poz. 41A) |
|----|------------|

44. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego:

A.

| | |
|-----------------|----|
| 1. jednostronne | 5 |
| 2. obustronne | 10 |

45. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

A. powikłane (należy dodać odpowiednie wartości uszczerbku):

| | |
|--------------------|-----|
| 1. jednostronne | +5 |
| 2. obustronne | +10 |
| 3. perlak | +5 |
| 4. próchnica kości | +5 |
| 5. polip ucha | +5 |

46. Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu

A.

| | |
|----|------------|
| 1. | (poz. 41A) |
|----|------------|

47. Uszkodzenie ucha wewnętrznego:

A.

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1. z uszkodzeniem części słuchowej | (poz. 41A) |
|------------------------------------|------------|

B. z uszkodzeniem części statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia

| | |
|--------------------------|-----|
| 1. zawroty głowy | +20 |
| 2. nudności, wymioty | +10 |
| 3. oczopląs spontaniczny | +10 |

C.

| | |
|--|---------|
| 1. z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej – część słuchową oceniać jak w pkt. A), część statyczną jak w pkt. B). | max. 60 |
|--|---------|

48. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:

A. jednostronne – w zależności od rozległości uszkodzenia:

| | |
|---|-----|
| 1. porażenie mięśni twarzy | +10 |
| 2. zaburzenia smaku i wydzielania śliny | +10 |
| 3. znaczne upośledzenie wydzielania łez | +10 |
| 4. uszkodzenie słuchu | +10 |

B.

| | |
|---------------|----|
| 1. obustronne | 60 |
|---------------|----|

E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU

49. Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji

| | |
|---|----|
| A. | |
| 1. niewielkie uszkodzenie funkcji połykania i artykulacji | 5 |
| 2. znaczne upośledzenie funkcji połykania i artykulacji | 10 |

50. Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej – w zależności od stopnia zwężenia

| | |
|--|----|
| A. | |
| 1. niewielka, sporadyczna duszność | 8 |
| 2. duszność przy umiarkowanych wysiłkach życia codziennego | 12 |
| 3. duszność przy niewielkich wysiłkach życia codziennego | 25 |

51. Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej (co najmniej 6 mieś. rehabilitacja logopedyczna):

A. w zależności od stopnia zaburzeń głosu

| | |
|--------------------|----|
| 1. mowa przełykowa | 35 |
| 2. mowa gardłowa | 50 |
| 3. z bezgłosem | 60 |

52. Uszkodzenie tchawicy. Zwężenie powodujące:

| | |
|---|----|
| A. | |
| 1. duszność przy szybkim chodzeniu po równym, wchodzeniu pod górę lub po schodach | 20 |
| 2. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami | 30 |
| 3. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie | 45 |
| 4. duszność spoczynkowa | 60 |

53. Uszkodzenie przełyku powodujące

A. (do oceny konieczna opinia specjalisty gastroenterologa lub chirurga przewodu pokarmowego)

| | |
|---|----|
| 1. niewielkie trudności w odżywianiu | 10 |
| 2. odżywianie się pokarmami o konsystencji półpłynnej | 30 |
| 3. odżywianie tylko płynami | 50 |
| 4. całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową | 80 |

54. Uszkodzenie tkanek miękkich (skóry i mięśni) szyi – w zależności od stopnia ruchomości i ustawienia głowy

| | |
|--|----|
| A. | |
| 1. blizny szyi nie powodujące zaburzeń ruchomości | 5 |
| 2. niewielkie ograniczenie ruchomości | 10 |
| 3. znaczne ograniczenia ruchomości w pozycji czynnościowo korzystnej | 15 |

| | |
|--|----|
| 4. znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej nieznacznie utrudniające czynności życia codziennego | 20 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| 5. znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej znacznie utrudniające czynności życia codziennego | 30 |
|---|----|

Uwaga: Uszkodzenia tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego należy oceniać według poz. 89.

F. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NASTĘPSTWA

55. Blizny i ubytki mięśni klatki piersiowej ograniczające ruchomość klatki piersiowej – w zależności od rozległości blizn, utrzymujących się bólów i od stopnia upośledzenia oddychania:

| | |
|--|----|
| A. | |
| 1. dolegliwości przy szybkim chodzeniu po równym, wchodzeniu pod górę lub po schodach i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała | 5 |
| 2. dolegliwości podczas chodzenia po równym z rówieśnikami i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała | 10 |
| 3. dolegliwości (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza lub do ustąpienia dolegliwości bólowych) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała | 15 |
| 4. dolegliwości wysiłkowe i spoczynkowe stałe, niezależne od przyjętej pozycji ciała | 30 |

56. „Utrata brodawki sutkowej u kobiet „częściowa“ lub „całkowita“ w zależności od zniekształceń i blizn (dla kobiet do 45 rż. x 2)

| | |
|--------------|---|
| A. | |
| 1. częściowa | 2 |
| 2. całkowita | 7 |

57. Utrata gruczołu piersiowego w zależności od wielkości ubytków i blizn (dla kobiet do 45 rż. x 2)

| | |
|---|----|
| A. częściowa | |
| 1. nie powodująca znacznego defektu kosmetycznego | 4 |
| 2. powodująca znaczny defekt kosmetyczny | 8 |
| B. | |
| 1. całkowita | 12 |
| C. | |
| 1. z częścią mięśnia piersiowego | 18 |

58. Uszkodzenie żeber (złamanie co najmniej 2 żeber)**A. z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc**

| | |
|--|---|
| 1. zniekształcenia niewielkie | 2 |
| 2. zniekształcenia powodujące znaczny defekt kosmetyczny | 5 |

B. z obecnością zniekształceń i ze zmniejszeniem pojemności życiowej płuc – w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej

| | |
|---|----|
| 1. duszność przy szybkim chodzeniu po równym, wchodzeniu pod górę lub po schodach | 10 |
| 2. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami | 15 |
| 3. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie | 20 |
| 4. duszność spoczynkowa | 25 |

59. Złamanie mostka ze zniekształceniami klatki piersiowej**A.**

| | |
|--------------------------|---|
| 1. niewielkiego stopnia | 3 |
| 2. umiarkowanego stopnia | 5 |
| 3. znacznego stopnia | 8 |

60. Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka**A.**

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. izolowane zapalenie kości | 10 |
| 2. zapalenie kości z przetokami | 20 |

61. Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):**A.**

| | |
|---------------------------------|---|
| 1. bez niewydolności oddechowej | 5 |
|---------------------------------|---|

B. z niewydolnością oddechową – w zależności od stopnia:

| | |
|---|----|
| 1. duszność przy szybkim chodzeniu po równym, wchodzeniu pod górę lub po schodach | 10 |
| 2. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami | 20 |
| 3. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie | 30 |
| 4. duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) | 40 |

62. Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc

– w zależności od stopnia niewydolności oddechowej

A.

| | |
|---|----|
| 1. duszność przy szybkim chodzeniu po równym, wchodzeniu pod górę lub po schodach | 40 |
| 2. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami | 50 |
| 3. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie | 60 |

4. duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) 80

Uwaga: Przy orzekaniu według pozycji 61 i 62 stopień uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej należy potwierdzić dodatkowymi badaniami obrazowymi lub czynnościowymi. Konieczna pełna dokumentacja medyczna!

63. Uszkodzenie serca lub osierdzia (pourazowe, pozawałowe)**A.**

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. z wydolnym układem krążenia | 10 |
|--------------------------------|----|

B. z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności (wg NYHA)

| | |
|--|----|
| 1. I stopień – bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego | 20 |
| 2. II stopień – umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego, upośledzenie wydolności fizycznej | 35 |
| 3. III stopień – znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne już przy zwykłych czynnościach życia codziennego | 50 |
| 4. IV stopień – duszność spoczynkowa | 90 |

Uwaga: Stopień uszkodzenia serca potwierdzić należy badaniami obrazowymi (EKG, RTG, ECHO i inne). Konieczna pełna dokumentacja medyczna !

64. Przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu

pokarmowego, oddychania i krążenia (jeśli występują dolegliwość zarówno ze strony układu sercowo-naczyniowego, jak i układu pokarmowego należy je zsumować)

A.

| | |
|--|-----|
| 1. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej niewielkiego stopnia – I st. wg NYHA | +3 |
| 2. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej – II st. wg NYHA | +5 |
| 3. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej – III st. wg NYHA | +15 |
| 4. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej – IV st. wg NYHA | +20 |

B.

| | |
|---|-----|
| 1. dolegliwości ze strony układu pokarmowego o umiarkowanym nasileniu | +10 |
| 2. dolegliwości ze strony układu pokarmowego o znacznym nasileniu (zaburzenia drożności układu pokarmowego) | +20 |

G. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA

65. Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny pourazowe, przetoki itp.)

– w zależności od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia powłok jamy brzusznej

A. blizny (dla kobiet x 2)

| | |
|------------------------------|---|
| 1. < 5 cm długości/średnicy | 1 |
| 2. > 5 cm długości /średnicy | 3 |

B.

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ubytki mięśniowe bez przepukliny | 5 |
|-------------------------------------|---|

C. przepukliny pourazowe

| | |
|---|----|
| 1. przepuklina pachwinowa | 10 |
| 2. przepuklina przedniej ściany brzucha | 20 |
| 3. przepuklina pępkowa | 20 |
| 4. przepuklina udowa | 10 |

D.

| | |
|--|----|
| 1. przetoki będące wynikiem powikłań pourazowych | 30 |
|--|----|

Uwaga: Za przepukliny pourazowe uważa się przepukliny spowodowane urazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych).

66. Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci:

A.

| | |
|--|---|
| 1. bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odżywiania | 5 |
|--|---|

B. z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – w zależności od stopnia zaburzeń stanu odżywiania:

| | |
|---|-----|
| 1. znaczna utrata masy ciała (>10%) | +10 |
| 2. objawy niedoboru białek | +5 |
| 3. objawy niedoboru węglowodanów | +5 |
| 4. objawy niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K) | +5 |
| 5. objawy niedoboru witaminy B12, kwasu foliowego, żelaza | +5 |
| 6. wtórne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze | +5 |

C. odżywianie jedynie parenteralne

50

67. Przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczenia się i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę:

A. jelita cienkiego

20+

| | |
|---|-----|
| 1. zapalenie tkanek otaczających przetokę | +10 |
| 2. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę | +5 |
| 3. niedostateczny stan odżywienia | +20 |
| 4. nieregularna wymiana torebek | +5 |
| 5. częsta wymiana torebek | +5 |
| 6. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny | +5 |

B. jelita grubego

15+

| | |
|---|-----|
| 1. zapalenie tkanek otaczających przetokę | +10 |
| 2. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę | +5 |
| 3. nieregularna wymiana torebek | +5 |
| 4. częsta wymiana torebek | +5 |
| 5. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny | +10 |

68. Przetoki okołoodbytnicze

A.

| | |
|----|----|
| 1. | 15 |
|----|----|

69. Uszkodzenia zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów

A.

| | |
|----|----|
| 1. | 60 |
|----|----|

70. Wypadnięcie odbytnicy – w zależności od stopnia wypadnięcia

A.

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. wypadanie błony śluzowej odbytnicy | 10 |
| 2. niepełne wypadanie odbytnicy | 20 |
| 3. pełne wypadanie odbytnicy | 30 |

71. Utrata śledziony

A.

| | |
|--|----|
| 1. bez istotnych zmian w obrazie krwi | 15 |
| 2. ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi | 30 |

72. Uszkodzenia wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki

– w zależności od stopnia powikłań (nie więcej niż 60)

A. uszkodzenie/resekcja fragmentu wątroby

| | |
|---|-----|
| 1. bez wpływu na funkcje narządu | +10 |
| 2. z następowymi zaburzeniami funkcji wątroby | +20 |

B. uszkodzenie/resekcja fragmentu trzustki

| | |
|---|-----|
| 1. bez wpływu na funkcje narządu | +10 |
| 2. z następowymi zaburzeniami funkcji zewnątrzwydzielniczej | +20 |
| 3. z następowymi zaburzeniami funkcji wewnątrzwydzielniczej | +20 |

C.

| | |
|---|-----|
| 1. uszkodzenie dróg żółciowych z następowym zwężeniem | +10 |
|---|-----|

H. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH

73. Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek prowadzące do powstania:

| | |
|----------------------------------|-----|
| A. | |
| 1. przewlekłych stanów zapalnych | +10 |
| 2. nadciśnienia | +15 |

74. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej

| | |
|-----------|----|
| A. | |
| 1. | 20 |

75. Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki lub uszkodzenie obu nerek prowadzące do ich schyłkowej niewydolności – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki (funkcja określana według badań laboratoryjnych i obrazu klinicznego)

| | |
|--|----|
| A. | |
| 1. utajona niewydolność nerek | 30 |
| 2. wyrównana niewydolność nerek | 40 |
| 3. niewyrównana niewydolność nerek | 50 |
| 4. schyłkowa niewydolność nerek (mocznica) | 75 |

76. Uszkodzenie moczowodu powodujące zwężenie jego światła

| | |
|-----------|----|
| A. | |
| 1. | 20 |

77. Uszkodzenie pęcherza

| | |
|-------------------------------------|-----|
| A. | |
| 1. przewlekłe stany zapalne | +10 |
| 2. zmniejszenie pojemności pęcherza | +10 |
| 3. zaburzenia w oddawaniu moczu | +10 |

78. Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego – w zależności od stopnia stałego zanieczyszczenia się moczem (do oceny po 6 miesiącach od urazu)

| | |
|--|----|
| A. | |
| 1. uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym i podjęcie pracy zarobkowej/nauki | 50 |
| 2. znacznie utrudniające wykonywanie pracy zarobkowej/nauki, praca/nauka w specjalnych warunkach | 30 |
| 3. nie utrudniające w sposób znaczący pracy zarobkowej/nauki | 20 |

79. Uszkodzenie cewki moczowej:

| | |
|--|----|
| A. | |
| 1. powodujące trudności w oddawaniu moczu | 10 |
| 2. powodujące przewlekły niezbyt pęcherza i nietrzymanie moczu | 20 |
| 3. powodujące zaleganie moczu i przewlekły stan zapalny | 30 |

80. Utrata prącia

| | |
|-----------|----|
| A. | |
| 1. | 40 |

81. Częściowa utrata prącia

| | |
|-----------|----|
| A. | |
| 1. | 20 |

82. Utrata jednego jądra lub jajnika

| | |
|-----------|----|
| A. | |
| 1. | 20 |

83. Utrata obu jąder lub jajników

| | |
|-----------|----|
| A. | |
| 1. | 40 |

84. Pourazowy wodniak jądra

| | |
|-----------|----|
| A. | |
| 1. | 10 |

85. Utrata macicy:

| | |
|---------------------------|----|
| A. | |
| 1. w wieku do 45 lat | 40 |
| 2. w wieku powyżej 45 lat | 20 |

86. Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych:

| | |
|--------------------|----|
| A. | |
| 1. pochwy | 10 |
| 2. pochwy i macicy | 30 |

I. OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTĘPSTWA.

(należy orzekać nie wcześniej niż po 6 miesiącach)

87. Nagłe zatrucie gazami oraz substancjami i produktami ze stwierdzoną utratą przytomności, lecz bez wtórnych powikłań dotyczących narządów wewnętrznych i układów oddechowego, sercowo-naczyniowego, krwiotwórczego.

A.

1. 10

88. Nagłe zatrucie gazami oraz substancjami i produktami (z wyjątkiem zatruc pokarmowych) powodujące trwałe uszkodzenie:

A.

1. narządów układu oddechowego i sercowo-naczyniowego (np. rozedma, kardiomiopatia) 20
2. układu krwiotwórczego (np. anemia aplastyczna) 25

Uwaga: Uszkodzenie narządów układu pokarmowego należy oceniać według odpowiednich pozycji rozdz. E i G. Uszkodzenie układu nerwowego należy oceniać według odpowiednich pozycji rozdz. A. Uszkodzenie narządu wzroku wskutek nagłych zatruc należy oceniać według odpowiednich pozycji rozdz. C max. 25

J. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

89. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym

A. z ograniczeniami ruchomości – bez trwałych zniekształceń kręgów

1. następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości bólowe, z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego głównie ruchów rotacyjnych. 5

2. następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości, bólowe z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego we wszystkich płaszczyznach. 8

B. z ograniczeniem ruchomości – ze zniekształceniem miernego stopnia

1. zmiany pourazowe z ograniczeniem ruchomości, ale z możliwością normalnego funkcjonowania 10

2. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości zwłaszcza ruchów rotacyjnych 15

3. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach 25

C. z całkowitym zeszywnieniem i niekorzystnym ustawieniem głowy

1. zmiany pourazowe powodujące ustawienie głowy w pozycji czynnościowo niekorzystnej 30

2. wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy, z zachowaniem śladowego bolesnego ruchu 40

3. wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy w pozycji skrajnie czynnościowo niekorzystnej 50

90. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th 1 – Th 11):

A. bez zniekształceń – w zależności od stopnia uszkodzenia

1. następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe, z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 3

2. następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe, z ograniczeniem zakresu ruchomości. 8

3. następstwa urazów powodujące znaczne dolegliwości bólowe, ze zniesieniem ruchomości 15

B. ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości – w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchomości

1. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 8

2. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 15

3. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości 25

91. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym (Th 12-L5) w zależności od ograniczenia ruchomości i zniekształcenia kręgów

A. z ograniczeniem ruchomości i bez wyraźnych zniekształceń

1. następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe, z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 3

2. następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe, z ograniczeniem zakresu ruchomości 8

B. mierne ograniczenia i zniekształcenia

1. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 8

2. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 15

3. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości 25

C. znaczne ograniczenia i zniekształcenia

1. zmiany pourazowe z dużymi zniekształceniami, ograniczeniem ruchomości, oraz zaburzające normalne funkcjonowanie 25

2. wielopoziomowe zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości 30

3. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach i nasilonym zespołem bólowym 40

92. Izolowane złamania wyrostków poprzecznych lub ościstych – w zależności od ich liczby, przemieszczeń i wpływu na ograniczenia ruchomości kręgosłupa

| | |
|--|---|
| A. | |
| 1. nie ograniczające ruchomości kręgosłupa | 3 |
| 2. ograniczające ruchomość kręgosłupa | 8 |

93. Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgow lub obecnością ciała obcego itp. (Wg. pozycji 89-92)

| | |
|-----------|-----|
| A. | |
| 1. | + 5 |

Uwaga: Pourazową niestabilność lub pourazowy kręgozmyk oceniać należy wg pozycji 89-92. Uszkodzenia mięśni kręgosłupa oceniać wg stopnia ograniczenia ruchomości kręgosłupa na danym odcinku. (98A, 90A, 91A)

94. Uszkodzenia rdzenia kręgowego

| | |
|--|-----|
| A. | |
| 1. przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn | 100 |

| | |
|--|----|
| B. | |
| 1. niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się jedynie przy pomocy dwóch łasek | 70 |

| | |
|---|----|
| C. | |
| 1. niedowład kończyn dolnych, umożliwiający poruszanie się o jednej łasce | 35 |

| | |
|--|-----|
| D. | |
| 1. porażenie całkowite kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (w następstwie wylewu śródrdzeniowego) | 100 |

| | |
|--|----|
| E. niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych, znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym) | |
| 1. z większym zajęciem kończyny górnej prawej | 80 |
| 2. z większym zajęciem kończyny górnej lewej | 60 |

| | |
|--|----|
| F. niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrdzeniowym) | |
| 1. z większym zajęciem kończyny górnej prawej | 40 |
| 2. z większym zajęciem kończyny górnej lewej | 20 |

| | |
|---|----|
| G. zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego) | |
| 1. zaburzenia funkcji zwieracza pęcherza i/lub odbytu lub sfery płciowej | 20 |
| 2. znaczne zaburzenia funkcji zwieraczy pęcherza, odbytu i sfery płciowej | 30 |
| 3. całkowita utrata funkcji zwieraczy pęcherza, odbytu i sfery płciowej | 40 |

H. zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów – w zależności od stopnia zaburzeń

| | |
|--|-----|
| 1. znaczne zaburzenia czucia | +15 |
| 2. umiarkowane zaburzenia czucia | +10 |
| 3. niewielkie zaburzenia czucia | +5 |
| 4. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych | +15 |
| 5. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych | +5 |

95. Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe lub mieszane) – w zależności od stopnia

| | |
|--|-----|
| A. szyjne | |
| 1. znaczne zaburzenia czucia | +5 |
| 2. umiarkowane zaburzenia czucia | +3 |
| 3. niewielkie zaburzenia czucia | +2 |
| 4. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych | +10 |
| 5. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych | +5 |
| 6. zaburzenia ruchu znacznego stopnia | +10 |
| 7. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia | +5 |
| 8. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia | +2 |
| 9. osłabienie siły mięśniowej | +5 |

| | |
|--------------|---|
| B. | |
| 1. piersiowe | 5 |

| | |
|--|-----|
| C. lędźwiowo-krzyżowe | |
| 1. znaczne zaburzenia czucia | +5 |
| 2. umiarkowane zaburzenia czucia | +3 |
| 3. niewielkie zaburzenia czucia | +2 |
| 4. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych | +10 |
| 5. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych | +5 |
| 6. zaburzenia ruchu znacznego stopnia | +10 |
| 7. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia | +5 |
| 8. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia | +2 |
| 9. osłabienie siły mięśniowej | +5 |

| | |
|-------------|---|
| D. | |
| 1. guziczne | 3 |

K. USZKODZENIA MIEDNICY

| | |
|--|-----|
| 96. Utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub rozerwanie stawu krzyżowo-biodrowego – w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu | |
| A. niewielkiego stopnia, | |
| 1. rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące miejscowe dolegliwości i bez istotnych zaburzeń chodu | 3 |
| 2. rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące dolegliwości podczas chodu | 8 |
| B. znacznego stopnia | |
| 1. rozerwanie spojenia powodujące dolegliwości w stawie krzyżowo-biodrowym | 12 |
| 2. rozerwanie spojenia wraz z podwichnięciem w stawie krzyżowo-biodrowym | 18 |
| 3. zwichnięcie w stawie krzyżowo-biodrowym z utrwalonymi dolegliwościami | 25 |
| 4. obustronne zwichnięcie w stawach krzyżowo-biodrowych | 35 |
| 97. Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno- lub wielomiejscowe | |
| A. w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa) | |
| 1. objawy neurologiczne ze strony jednego nerwu | +5 |
| 2. objawy neurologiczne ze strony dwóch lub trzech nerwów | +10 |
| 3. zaburzenia chodu | +5 |
| 4. jednostronne złamania k. kulszowej lub łonowej wygojone z niewielkimi przemieszczeniami | +2 |
| 5. jednostronne złamania k. kulszowej i łonowej wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami | +5 |
| 6. obustronne złamania k. kulszowych i łonowych wygojone z niewielkimi przemieszczeniami | +8 |
| 7. obustronne złamania k. kulszowych i łonowych wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami | +10 |
| B. w odcinku tylnym (typ Malgaigne' a) | |
| 1. podwójne, pionowe złamanie z przemieszczeniem do 2 cm i miernymi dolegliwościami bólowymi | 15 |
| 2. podwójne, pionowe złamanie miednicy z przemieszczeniem powyżej 2 cm i średniego stopnia dolegliwościami bólowymi | 20 |
| 3. podwójne, pionowe złamanie miednicy z większymi przemieszczeniami i znacznymi dolegliwościami oraz zaburzeniami statyki i chodu | 30 |
| 4. obustronne, podwójne złamania w odcinku tylnym ze znacznymi dolegliwościami i/lub z uszkodzeniem pęcherza i cewki moczowej. | 45 |
| 98. Złamanie panewki stawu biodrowego, stropu panewki – w zależności od przemieszczeń, zbrońności stawu stopnia zwichnięcia i zakresu ruchów | |
| A. | |
| 1. zwichnięcie I° | 10 |

| | |
|---|----|
| B. | |
| 1. zwichnięcie II° | 15 |
| C. | |
| 1. zwichnięcie III° | 20 |
| D. zwichnięcie IV° | |
| 1. pozwalające na w miarę sprawny chód, bez nasilonych dolegliwości bólowych | 24 |
| 2. upośledzenie sprawności chodu, z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana, stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa | 32 |
| 3. znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana, stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa | 40 |
| 99. Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) w zależności od zniekształceń i zaburzeń funkcji | |
| A. | |
| 1. pojedyncze, jednostronne złamania talerzy biodrowych lub kolców biodrowych | 3 |
| 2. mnogie, jednostronne złamania dające deformację miednicy | 7 |
| 3. obustronne złamania powodujące znaczne dolegliwości bólowe | 12 |
| 4. obustronne złamania powodujące znaczne deformacje i dolegliwości | 20 |

L. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

| Łopátka | prawa | lewa |
|---|-------|------|
| 100. Złamanie łopatki | | |
| A. wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem, bez większych zaburzeń funkcji | | |
| 1. złamanie wygojone z miejscowymi dolegliwościami bez ograniczeń zakresu ruchomości w stawie | 1 | 1 |
| 2. złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami oraz z miejscowymi dolegliwościami i bez ograniczeń zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym | 4 | 2 |
| 3. złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami z miejscowymi dolegliwościami i ograniczeniami ruchomości w postaci ograniczenia unoszenia ramienia do 140° | 8 | 4 |
| B. wygojone złamanie łopatki z dużym przemieszczeniem i wyraźnym upośledzeniem funkcji kończyny – w zależności od zaburzeń | | |
| 1. złamania wygojone z przemieszczeniem, z większymi dolegliwościami bólowymi oraz z możliwością unoszenia ramienia do kąta 90-130° | 12 | 8 |
| 2. złamanie wygojone z wytworzeniem przykurczu nie pozwalającego na unoszenie ramienia ponad 90° | 16 | 12 |
| 3. złamanie wygojone z ograniczeniem zakresu odwodzenia w stawie barkowym do 45°, pozostałych ruchów zwłaszcza rotacji, z zanikami mięśni obręczy barkowej, ale bez uszkodzeń neurologicznych | 24 | 16 |

| | | |
|--|----|----|
| 4. złamania wygojone ze śladem ruchu w stawie barkowym, z powikłaniami neurologicznymi | 32 | 20 |
| C. wygojone złamanie szyjki i panewki, z dużym przemieszczeniem, przykurczem w stawie łopatkowo-ramiennym, z dużymi zanikami mięśni itp. | | |
| 1. złamanie wygojone z przemieszczeniem odpowiadającym nieodprowadzalnemu zwężeniu w stawie łopatkowo-ramiennym lub stawowi cepowemu | 35 | 30 |
| 2. złamanie wygojone jak opisano wyżej ze znacznym uszkodzeniem spłotu barkowego | 50 | 40 |
| Uwaga: Normy pozycji 100 zawierają również ewentualne powikłania neurologiczne! | | |
| Obojczyk | | |
| 101. Wadliwie wygojone złamanie obojczyka – w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów | | |
| A. nieznaczne zmiany | | |
| 1. niewielka deformacja | 1 | 1 |
| 2. wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym. | 4 | 2 |
| 3. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym | 8 | 4 |
| B. wyraźne zmiany | | |
| 1. znaczna deformacja, powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego, zaniki mięśnia naramiennego, mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° | 12 | 8 |
| 2. znaczna deformacja, powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego, zaniki mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia poniżej kąta 90° i z ograniczeniami ruchów rotacyjnych | 16 | 12 |
| 3. znaczna deformacja, z bolesnym przykurczem stawu barkowego pozostawiająca jego śladowy ruch | 24 | 16 |
| 102. Staw rzekomy obojczyka – w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny | | |
| A. nieznaczne zmiany | | |
| 1. wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym. | 4 | 2 |
| 2. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°, z ograniczeniem ruchów rotacyjnych | 8 | 4 |

| | | |
|--|----|----|
| B. znaczne zmiany | | |
| 1. znaczna deformacja, ze skróceniem wymiaru poprzecznego stawu barkowego, z ograniczeniem zakresu ruchomości w przedziale do 90-130°, zniesieniem ruchów rotacyjnych | 12 | 8 |
| 2. znaczna deformacja, po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem, z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch | 16 | 12 |
| 3. znaczna deformacja, po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem, patologiczna ruchomość odłamów, skrócenie wymiaru poprzecznego barku, zeszywnienie stawu łopatkowo-ramiennego | 24 | 16 |
| 103. Zwężenie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego w zależności od ograniczenia ruchów, upośledzenia zdolności dźwignia i stopnia deformacji | | |
| A. nieznaczne zmiany | | |
| 1. niewielka deformacja | 1 | 1 |
| 2. wyraźna deformacja wynikająca z odstawania – objawu klawisza (I lub II °) bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym. | 4 | 2 |
| 3. wyraźna deformacja wynikająca z odstawania – objawu klawisza (II lub III°) z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°, z ograniczeniem ruchów rotacyjnych | 8 | 4 |
| B. znaczne zmiany | | |
| 1. znaczna deformacja, patologiczna ruchomość, ograniczenia zakresu ruchomości w przedziale od 90 do 130°, zniesienie rotacji zewnętrznej | 12 | 8 |
| 2. znaczna deformacja, po próbie leczenia operacyjnego zakończonego niepowodzeniem, z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch | 16 | 12 |
| 3. znaczna deformacja, patologiczna ruchomość, z ograniczeniem sprawności, po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem, patologiczna ruchomość, skrócenie wymiaru poprzecznego barku i całkowite zeszywnienie stawu łopatkowo-barkowego | 20 | 16 |
| 104. Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych ocenia się wg. pozycji 101-103 zwiększając stopień trwałego uszczerbku o | | |
| A. | | |
| 1. przewlekłe zapalenia kości | | +2 |
| 2. przetoki | | +2 |
| 3. ciała obce | | +2 |

Uwaga: Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych należy stosować ocenę wg. pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny – w zależności od stopnia ograniczenia funkcji

Bark

| | | |
|--|----|----|
| 105. Uszkodzenie stawu łopatkowo – ramiennego – w zależności od blizn, ograniczeń ruchomości, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń złamanej głowy nasady bliższej kości ramiennej i innych zmian wtórnych | | |
| A. miernego stopnia | | |
| 1. niewielka deformacja | 1 | 1 |
| 2. wyraźne zmiany powodujące deformację barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym. | 4 | 2 |
| 3. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°, z ograniczeniem ruchów rotacyjnych, z zanikiem mięśnia naramiennego oraz mięśni ramienia o 2 cm | 8 | 4 |
| B. średniego stopnia | | |
| 1. znaczna deformacja, bliznowaty przykurcz, zaniki mięśnia naramiennego, mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° | 12 | 8 |
| 2. znaczna deformacja, z bolesnym przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch | 16 | 12 |
| C. dużego stopnia | | |
| 1. znaczna deformacja stawu łopatkowo-barkowego całkowite zeszywnienie stawu łopatkowo-barkowego | 20 | 16 |
| 2. znaczna deformacja stawu ze znacznymi dolegliwościami, powodującymi duże zaburzenia funkcji zbliżone do zeszywnienia stawu w pozycji czynnościowo niekorzystnej | 24 | 20 |
| 106. Zastarzałe, nieodprowadzalne zwichnięcie stawu barkowego – w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny | | |
| A. | | |
| 1. nieodprowadzalne zwichnięcie pozwalające na wykonywanie podstawowych czynności | 20 | 15 |
| 2. nieodprowadzalne zwichnięcie z ustawieniem kończyny w pozycji czynnościowo niekorzystnej w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej | 25 | 20 |
| 3. nieodprowadzalne zwichnięcie graniczące z bezużytecznością kończyny | 30 | 25 |
| 107. Nawykowe zwichnięcie potwierdzone rentgenem i zaświadczeniami lekarskimi o kilkakrotnym zwichnięciu | | |
| A. | | |
| 1. | 25 | 20 |

Uwaga: Odnosi się do nawyku zwichania, który nie może być wyleczony operacyjnie lub nawrotów nawykowych zwichnięć po leczeniu operacyjnym bez rokowania na poprawę. Wszelkie inne nawrotowe lub nawykowe zwichnięcia, jak również stawy barkowe po leczeniu operacyjnym nawykowego zwichnięcia winny być orzekane jak przykurcze stawu po urazach.

| | | |
|--|----|----|
| 108. Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości – w zależności od zaburzeń funkcji | | |
| A. | | |
| 1. Staw cepowy z możliwością wykonywania ruchów czynnych barku | 25 | 20 |
| 2. Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku bez istotnych ubytków ruchu, ze skróceniem długości ramienia do 5 cm. | 30 | 25 |
| 3. Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku ze znacznymi ubytkami kości, ze skróceniem wymiaru ramienia ponad 5 cm. | 40 | 35 |
| Uwaga: Staw wiotki z powodu porażen ocenia się wg. norm neurologicznych, rozdz. N. | | |
| 109. Zeszywnienie stawu barkowego | | |
| A. w ustawieniu czynnościowo korzystnym (odwiedzeniu ok. 70°, antepozycji 35°, rotacji zewnętrznej 25°) – w zależności od ustawienia i funkcji | | |
| 1. z prawidłowo zachowaną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości samego barku oraz z substytucją ruchu w stawie łopatkowo-żebrowym | 20 | 15 |
| 2. z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości i z niezadowalającą substytucją ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym | 25 | 20 |
| 3. z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i ze znacznymi dolegliwościami samego barku | 30 | 25 |
| B. | | |
| 1. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 35 | 30 |
| 110. Bliznowaty przykurcz stawu barkowego | | |
| A. | | |
| 1. niewielkie ograniczenie ruchomości | 2 | 1 |
| 2. wyraźny przykurcz z zaburzeniami ruchomości | 6 | 3 |
| 3. wyraźny przykurcz z możliwością unoszenia kończyny do kąta 100° | 12 | 6 |
| 111. Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, z przetokami i zmianami neurologicznymi – ocenia się wg. pozycji 105-110, zwiększając stopień uszczerbku w zależności od stopnia powikłań i zaburzeń funkcji o | | |
| A. | | |
| 1. przewlekłe zapalenie kości | +8 | +4 |
| 2. ciała obce | +8 | +4 |
| 3. przetoki | +8 | +4 |
| 4. zmiany bneurologiczne | +8 | +4 |

| | | |
|--|----|----|
| 112. Utrata kończyny w barku | | |
| A. | | |
| 1. | 75 | 70 |
| 113. Utrata kończyny wraz z łopatką | | |
| A. | | |
| 1. | 80 | 70 |
| Ramię | | |
| 114. Złamanie trzonu kości ramiennej – w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym | | |
| A. niewielkie zmiany | | |
| 1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne | 2 | 1 |
| 2. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne | 4 | 2 |
| 3. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 20° lub rotacyjnym, zaburzające czynność kończyny | 8 | 4 |
| 4. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym ponad 20° lub rotacyjnym, istotnie zaburzające czynność kończyny | 12 | 8 |
| B. duże zmiany | | |
| 1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 3 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub rotacyjnym oraz z zeszywnieniem łokcia | 16 | 12 |
| 2. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem < 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zeszywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego | 20 | 16 |
| 3. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zeszywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego | 24 | 20 |
| C. złamanie powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi | | |
| 1. Złamanie wygojone ze zrostem, z zachowaniem osi kończyny powikłane zapaleniem kości | 30 | 25 |
| 2. Staw rzekomy kości ramieniowej | 35 | 30 |
| 3. Zakażony staw rzekomy kości ramieniowej | 40 | 35 |
| 4. Zakażony staw rzekomy kości ramieniowej z powikłaniami neurologicznymi | 50 | 45 |

| | | |
|---|----|----|
| 115. Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji | | |
| A. zmiany średnie | | |
| 1. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące dolegliwości głównie subiektywne | 2 | 1 |
| 2. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące niewielkie upośledzenie funkcji oraz dolegliwości głównie subiektywne | 4 | 2 |
| 3. uszkodzenie ścięgien, mięśni i ich przyczepów powodujące średnie upośledzenie funkcji z osłabieniem siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) | 8 | 4 |
| B. zmiany duże | | |
| 1. uszkodzenie ścięgien, mięśni i ich przyczepów powodujące upośledzenie funkcji z osłabieniem siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) | 12 | 8 |
| 2. uszkodzenie ścięgien, mięśni i ich przyczepów powodujące osłabienie ich siły do 3 w skali Lovetta lub znaczne ograniczenia ruchomości łokcia do kąta prostego | 16 | 12 |
| 3. uszkodzenie ścięgien, mięśni i ich przyczepów powodujące zniesienie funkcji zginania lub prostowania łokcia, lub przykurcz łokcia w pozycji zbliżonej do kąta prostego | 20 | 16 |
| 116. Utrata kończyny w obrębie ramienia | | |
| A. | | |
| 1. z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej | 70 | 65 |
| 2. przy dłuższych kikutach | 65 | 60 |
| 117. Przepukliny mięśniowe ramienia | | |
| | 3 | 3 |
| Staw łokciowy | | |
| 118. Złamanie obwodowej nasady kości ramieniowej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej – w zależności od zniekształceń i ograniczenia ruchów. | | |
| A. niewielkie zmiany | | |
| 1. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych | 2 | 1 |
| 2. dolegliwości głównie subiektywne oraz ograniczenia ruchomości głównie wyprostu o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji, przy jednocześnie zachowanej osi stawu | 4 | 2 |
| B. średnie zmiany | | |
| 1. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130°, z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji), z zachowaną osią stawu | 8 | 6 |
| 2. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130°, z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji), z zachowaną osią stawu | 12 | 10 |

| | | |
|---|----|----|
| C. duże zmiany | | |
| 1. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130°, z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 110° (w sumie supinacji i pronacji), z zaburzoną nieznacznie osią stawu | 16 | 12 |
| 2. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 45° (w sumie supinacji i pronacji) z zaburzoną osią stawu w granicach 15° koślawości lub 15° szpotawości | 20 | 16 |
| 3. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 75° do 110° z zachowaniem ruchów obrotowych lub całkowite zniesienie ruchów obrotowych < 45°, przy zakresie ruchomości łokcia 50°-130° oraz przy zaburzeniach osi łokcia powyżej 15° koślawości oraz 15° szpotawości | 24 | 20 |
| 119. Zesztywnienie stawu łokciowego | | |
| A. | | |
| 1. w zgięciu zbliżonym do kąta prostego (75°-110°), przy zachowanych ruchach obrotowych | 30 | 25 |
| B. | | |
| 1. z brakiem ruchów obrotowych | 35 | 30 |
| C. | | |
| 1. w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160°-180°) | 50 | 45 |
| D. w innych ustawieniach – w zależności od przydatności czynnościowej kończyny | | |
| 1. w pozycji zbliżonej do kąta prostego | 30 | 25 |
| 2. w pozycji zgięcia 50°-90° | 35 | 30 |
| 3. w pozycji zgięcia powyżej 90° oraz wyprostnej poniżej 50° | 45 | 40 |
| 120. Przykurcz w stawie łokciowym – w zależności od zakresu zgięcia, wyprost | | |
| A. przy możliwości zgięcia ponad kąt prosty | | |
| 1. ograniczenia ruchomości głównie wyprost o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji, | 4 | 2 |
| 2. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji) | 8 | 6 |
| 3. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji) | 12 | 8 |
| B. przy niemożności zgięcia do kąta prostego | | |
| 1. ograniczenia ruchomości od wyprost od 40° do 90° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 110° rotacji | 16 | 12 |
| 2. ograniczenia ruchomości od wyprost 40° do 75° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 45° rotacji, lub z przykurczem w maksymalnej pronacji | 20 | 16 |

| | | |
|---|----|----|
| 3. ograniczenia ruchomości zbliżone do zeszywnienia łokcia w pozycji bliżej 90° z zachowanym, lecz ograniczonym ruchem rotacji poniżej 45° lub z przykurczem w maksymalnej supinacji | 28 | 24 |
| Uwaga : Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego – oceniać wg. poz.118-120 | | |
| 121. Cepowy staw łokciowy – w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni | | |
| A. | | |
| 1. z zachowaną i dającą użyteczność czynnością stawu łokciowego | 16 | 12 |
| 2. ze śladem ruchu dowolnego, śladowa użyteczność stawu łokciowego | 20 | 16 |
| 3. całkowicie wiotki staw, z niestabilnością wielopłaszczyznową, całkowita bezużyteczność czynnościowa stawu łokciowego | 28 | 20 |
| 122. Uszkodzenie stawu łokciowego powikłane – ocenia się wg poz. 118-121, zwiększając stopień trwałego uszczerbku o: | | |
| A. | | |
| 1. przewlekły stan zapalny | +2 | +1 |
| 2. przetoki | +2 | +1 |
| 3. ciała obce | +2 | +1 |
| Przedramię | | |
| 123. Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych | | |
| A. niewielkie zniekształcenia | | |
| 1. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych | 2 | 1 |
| 2. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia | 4 | 2 |
| B. średnie zniekształcenia | | |
| 1. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości) obejmujące pozycję pośrednią oraz przy istotnych ograniczeniach rotacji | 8 | 6 |
| 2. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20°(na pograniczu zeszywnienia) jednak w pozycji czynnościowo korzystnej z ewentualną dewiacją nadgarstka, przy istotnych ograniczeniach zakresu ruchów rotacji przedramienia | 12 | 8 |
| 3. następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka na pograniczu zeszywnienia z utrwaloną dewiacją nadgarstka z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° | 16 | 12 |

| | | |
|---|----|----|
| C. znaczne zniekształcenia, duże ograniczenia ruchów, zmiany wtórne (troficzne, krążeniowe) | | |
| 1. następstwa w postaci wygojenia ze znacznymi przemieszczeniami w efekcie zeszywnieniem nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej, z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110°, z upośledzeniem ruchów palców zaburzającym precyzyjny chwyt | 20 | 16 |
| 2. następstwa w postaci zeszywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej, ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia z ograniczeniem ruchomości palców zaburzającym sprawny chwyt | 24 | 20 |
| 3. następstwa w postaci zeszywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej, ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia, z zeszywnieniem palców i powikłane zespołem algodystroficznym | 32 | 24 |
| 124. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w zależności od przemieszczeń zniekształceń i zaburzeń czynnościowych | | |
| A. niewielkie zmiany | | |
| 1. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych | 2 | 1 |
| 2. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia | 4 | 2 |
| B. średnie zmiany | | |
| 1. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniem, powodującym ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości), obejmujące pozycję pośrednią, oraz ograniczenia zakresu ruchomości łokcia z ubytkiem wyprostów, oraz przy istotnych ograniczeniach rotacji | 8 | 6 |
| 2. następstwa złamań wygojonych z dużym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacji przedramienia, oraz ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20° (na pograniczu zeszywnienia), jednak w pozycji czynnościowo korzystnej, z ewentualną dewiacją nadgarstka oraz przy zachowanej funkcji chwytnej ręki | 12 | 8 |
| 3. następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° oraz ograniczenia ruchomości nadgarstka na pograniczu zeszywnienia z utrwaloną dewiacją | 16 | 12 |
| C. duże zmiany, zmiany wtórne i inne | | |
| 1. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem, ze skróceniem jednej z kości przedramienia, z wtórnymi zmianami w obrębie nadgarstka w postaci zeszywnienia i/lub dewiacji | 20 | 16 |

| | | |
|---|----|----|
| 2. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem, ze skróceniem jednej z kości lub ze wzrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia, z ograniczeniem zakresu ruchów rotacyjnych do 45°, z ograniczeniem ruchomości łokcia w zakresie 75°-110° oraz z zaburzeniem sprawności chwytu ręki | 24 | 20 |
| 3. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem, ze skróceniem jednej z kości lub ze wzrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia, z całkowitym zniesieniem ruchów rotacyjnych, z zeszywnieniem łokcia w pozycji zbliżonej do 90°, oraz wtórną deformacją nadgarstka i jego ustawieniem w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej | 30 | 24 |
| 125. Uszkodzenia części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń – w zależności od rozmiarów, uszkodzeń i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny) | | |
| A. niewielkie zmiany | | |
| 1. blizny i miejscowe dolegliwości | 1 | 1 |
| 2. blizny, miejscowe dolegliwości i towarzyszące im zmiany troficzne nie upośledzające funkcji przedramienia i ręki w sposób istotny | 3 | 2 |
| B znaczne zmiany | | |
| 1. następstwa w postaci blizn powodujących dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60° (około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią łokcia lub nadgarstka | 8 | 6 |
| 2. następstwa w postaci blizn i przykurczów powodujących ograniczenia ruchomości nadgarstka w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią, przy zachowanych ruchach rotacji przedramienia | 12 | 8 |
| 3. następstwa w postaci blizn, zmian troficznych i przykurczów powodujących znaczne ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) przy ograniczonym, ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia lub powodujące przykurcz w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej | 16 | 12 |
| 126. Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych | | |
| A. średniego stopnia | | |
| 1. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością, z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka, bez upośledzenia funkcji chwytnej, ręki z zachowaną ruchomością łokcia, bez zmian troficznych | 12 | 10 |
| 2. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością, z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka, z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki, z zachowaną ruchomością łokcia, bez zmian troficznych | 16 | 12 |

| | | |
|---|----|----|
| B. znacznego stopnia | | |
| 1. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z patologiczną ruchomością, zaburzoną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka, miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki, z zachowaną ruchomością łokcia, bez zmian troficznych | 20 | 16 |
| 2. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość, z zaburzoną osią przedramienia, z ograniczoną ruchomością nadgarstka, z wyraźnym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki, z zachowaną ruchomością łokcia, a także ze zmianami troficznymi | 28 | 24 |
| 3. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość, z zaburzoną osią przedramienia, ze znacznym ograniczeniem ruchomości nadgarstka, z upośledzeniem funkcji chwytnej ręki, ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia, a także ze zmianami troficznymi | 35 | 28 |
| 127. Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia – w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych | | |
| A. średniego stopnia | | |
| 1. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością, z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka, bez upośledzenia funkcji chwytnej ręki, z zachowaną ruchomością łokcia bez zmian troficznych | 12 | 10 |
| 2. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością, z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka, z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki, bez zmian troficznych | 16 | 12 |
| 3. staw rzekomy obu kości przedramienia z zaburzoną osią przedramienia, z obecnością blizn, zniekształceń, upośledzeniem funkcji chwytnej ręki, z zachowaną ruchomością łokcia, bez zmian troficznych | 20 | 16 |
| B. znacznego stopnia | | |
| 1. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość, z zaburzeniem osi przedramienia, z zachowaną ruchomością nadgarstka, z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki, z zachowaną ruchomością łokcia, a także ze zmianami troficznymi | 25 | 20 |
| 2. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość, z zaburzeniem osi przedramienia, z zachowaną ruchomością nadgarstka, ze znacznym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki, z zachowaną ruchomością łokcia, a także ze zmianami troficznymi | 30 | 25 |
| 3. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość, z zaburzeniem osi przedramienia, z zeszywnieniem nadgarstka, upośledzeniem funkcji chwytnej ręki oraz ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia, a także ze zmianami troficznymi | 40 | 35 |

| | | |
|--|----|----|
| 128. Powikłane uszkodzenie przedramienia ocenia się wg poz.123-127, zwiększając stopień trwałego uszczerbku w zależności od powikłań o | | |
| A. | | |
| 1. przewlekłe zapalenie kości | +3 | +3 |
| 2. przetoki | +3 | +3 |
| 3. obecność ciał obcych | +3 | +3 |
| 4. ubytek tkanki kostnej | +3 | +3 |
| 5. zmiany neurologiczne | +3 | +3 |
| 129. Utrata kończyny w obrębie przedramienia | | |
| A. | | |
| 1. | 60 | 55 |
| 130. Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego | | |
| A. | | |
| 1. | 55 | 50 |
| Nadgarstek | | |
| 131. Uszkodzenia nadgarstka (skręcenia, zwichnięcia, złamania) w zależności od blizn, zniekształceń rozległości uszkodzenia, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych wtórnych | | |
| A. niewielkiego stopnia | | |
| 1. następstwa niewielkiego stopnia powodujące jedynie dolegliwości subiektywne | 2 | 1 |
| 2. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 90° (około 75% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią | 4 | 2 |
| 3. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60°(około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią | 8 | 4 |
| B. średniego stopnia | | |
| 1. następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią, ze zniesieniem ruchów odchylenia na boki, przy zachowanym ruchu rotacji przedramienia. | 12 | 10 |
| 2. następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią, ze zniesieniem ruchów odchylenia na boki, przy ograniczonym, ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia | 16 | 12 |
| C. dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym | | |
| 1. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się poza pozycją pośrednią w przedziale zgięcia dłoniowego lub w skrajnym zgięciu grzbietowym z utrwaloną dewiacją łokciową lub promieniową | 20 | 16 |

| | | |
|--|----|----|
| 2. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się wyłącznie w zakresie zgięcia dłoniowego z utrwalonymi odchyleniami łokciowym lub promieniowym | 28 | 24 |
| 132. Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka | | |
| A. w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców | | |
| 1. zeszywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej, z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V, z zachowaną funkcją kciuka | 16 | 12 |
| 2. zeszywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej, z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego, z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka | 20 | 16 |
| 3. zeszywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej, z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka | 28 | 20 |
| B. w ustawieniu czynnościowo-niekorzystnym w zależności od stopnia upośledzenia funkcji ręki i palców | | |
| 1. zeszywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej, z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V, z zachowaną funkcją kciuka | 25 | 20 |
| 2. zeszywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej, z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego, z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka | 35 | 30 |
| 3. zeszywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej, z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka | 45 | 40 |
| 133. Uszkodzenia nadgarstka powikłane głębokimi, trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się wg.poz.131-132, zwiększając stopień trwałego uszczerbku – w zależności od stopnia o | | |
| A. | | |
| 1. głębokie, trwałe zmiany troficzne | +3 | +3 |
| 2. przewlekłe, ropne zapalenie kości nadgarstka | +3 | +3 |
| 3. przetoki | +3 | +3 |
| 4. zmiany neurologiczne | +3 | +3 |

| | | |
|---|----|----|
| 134. Utrata ręki na poziomie nadgarstka | | |
| A. | | |
| 1. | 55 | 50 |
| Śródrezcze | | |
| 135. Uszkodzenia śródrezcza, części miękkich (skóry, mięśni, naczyń, nerwów), kości w zależności od blizn, zniekształceń, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych | | |
| A. niewielkie zmiany | | |
| 1. następstwa złamań jednej kości śródrezcza – od III do V pod postacią blizn i dolegliwości subiektywnych | 2 | 1 |
| 2. następstwa złamań jednej kości śródrezcza – od III do V pozostawiające deformację i powodujące ograniczenia zakresu ruchów palca odpowiadające przynajmniej amputacji na poziomie paliczka dystalnego | 4 | 2 |
| B. średnie zmiany | | |
| 1. następstwa złamań pierwszej lub drugiej kości śródrezcza z następstwami jak powyżej lub kilku kolejnych z następstwami odpowiadającymi amputacji paliczka dystalnego | 8 | 4 |
| C. rozległe zmiany | | |
| 1. następstwa złamań kilku kości śródrezcza powodujące znaczną deformację z ograniczeniami funkcji chwytnej palców II do V spowodowanej zeszywnieniem stawów śródreczno-paliczkowych, lub ograniczeniem samej opozycji kciuka, odpowiadające amputacji na poziomie paliczka podstawnego | 12 | 10 |
| 2. następstwa złamań kilku kości śródrezcza powodujące znaczną deformację z brakiem funkcji chwytnej palców II do V, lub uszkodzenie I kości śródrezcza z całkowitym zniesieniem funkcji chwytnej kciuka | 18 | 16 |
| Kciuk | | |
| 136. Utrata w zakresie kciuka – w zależności od rozmiaru ubytku, blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych | | |
| A. | | |
| 1. częściowa utrata opuszki | 4 | 2 |
| 2. utrata paliczka paznokciowego | 8 | 4 |
| 3. utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem więcej niż 2/3 długości kikuta paliczka | 15 | 10 |
| 4. utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem mniej niż 2/3 długości kikuta paliczka | 18 | 14 |
| 5. utrata obu paliczków z kością śródrezcza | 25 | 20 |

| | | |
|--|----|----|
| 137. Inne uszkodzenia kciuka (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów – w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych) | | |
| A. | | |
| 1. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej, blizny nie ograniczające ruchów kciuka i inne | 1 | 1 |
| 2. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki | 4 | 2 |
| 3. średnie zmiany następstwa odpowiadające częściowej utracie paliczka paznokciowego | 8 | 6 |
| 4. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej częściowej utracie 1/2 paliczka podstawnego | 16 | 12 |
| 5. upośledzenie funkcji graniczące z następstwami utraty kciuka | 24 | 18 |
| Uwaga: Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka należy brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawiania oraz chwytu. | | |
| Palec wskazujący | | |
| 138. Utrata w obrębie wskaziciela (blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) – w zależności od stopnia | | |
| A. | | |
| 1. utrata częściowa opuszki | 4 | 2 |
| 2. utrata paliczka paznokciowego | 6 | 4 |
| 3. utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego | 8 | 5 |
| 4. utrata paliczka paznokciowego i środkowego poniżej 1/3 | 10 | 8 |
| 5. utrata 3 paliczków | 16 | 12 |
| 6. utrata palca wskazującego z kością śródreżca | 22 | 20 |
| 139. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego (blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) powodujące: | | |
| A. | | |
| 1. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej, blizny nie ograniczające ruchów wskaziciela i inne | 1 | 1 |
| 2. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki | 4 | 2 |
| 3. zmiany średniego stopnia następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka paznokciowego i/lub części paliczka podstawnego | 8 | 6 |

| | | |
|--|----|----|
| 4. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka środkowego i/lub paliczka podstawnego z pozostawieniem jego kikuta mającego jeszcze znaczenie czynnościowe | 12 | 10 |
| 5. bezużyteczność wskaziciela, granicząca z jego utratą | 16 | 12 |

Palec trzeci, czwarty i piąty

| | | |
|---|----|---|
| 140. | | |
| A. Palec trzeci, czwarty i piąty – w zależności od stopnia uszkodzenia | | |
| 1. zniekształcenia płytki paznokciowej, blizny nie ograniczające ruchów palców i inne | 1 | 1 |
| 2. częściowa utrata opuszki | 2 | 1 |
| 3. utrata paliczka paznokciowego | 4 | 3 |
| 4. utrata dwóch paliczków | 6 | 5 |
| 5. utrata trzech paliczków | 10 | 8 |

| | | |
|--|----|----|
| 141. Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca | | |
| A. | | |
| 1. | 15 | 10 |

Uwaga: Przy wcześniejszym braku wskaziciela obecne uszkodzenia palca III traktować należy jak by to był wskaziciel

| | | |
|---|------|----|
| 142. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze, zeszywnienia stawów, zmiany troficzne, czuciowe i tp.) – za każdy palec w zależności od obecności: | | |
| A. | | |
| 1. blizny | +1 | +1 |
| 2. uszkodzenia ścięgien | +1,5 | +1 |
| 3. przykurczów | +1,5 | +1 |
| 4. zeszywnienia stawów | +1,5 | +1 |
| 5. zmian troficznych i/lub czuciowych | +1,5 | +1 |
| 6. całkowitej bezużyteczności | 9 | 7 |

Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujących większą ilość palców ocena musi odpowiadać stopniowi użyteczności ręki, jednak uszczerbek musi być niższy niż całkowita utrata tych palców, oraz uszkodzenia obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie może przekraczać dla ręki prawej 55% i 50% dla lewej.

M. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ

Staw biodrowy

143. Utrata kończyny dolnej poprzez jej wyłuszczenie w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej – w zależności od zniekształceń, stanu kikuta i możliwości zaprotezowania

A.

| | |
|---|----|
| 1. kikut okolicy krętarzowej dający możliwość zaprotezowania | 75 |
| 2. kikut ze zmianami troficznymi, bliznowato zniekształcony bez możliwości zaprotezowania | 80 |
| 3. wyłuszczenie w stawie biodrowym | 85 |

144. Uszkodzenie tkanek miękkich, aparatu więzadłowego, mięśni, naczyń, nerwów, skóry – w zależności od stopnia ograniczenia ruchów

A. miernego stopnia

| | |
|--|---|
| 1. następstwa uszkodzeń (np. urazów skrętnych) wygojonych bez przykurczów, dające dolegliwości subiektywne, oraz zachowujące wydolny chód | 4 |
| 2. następstwa uszkodzeń (np. urazów skrętnych) wygojonych z niewielkim przykurczem, dające dolegliwości subiektywne oraz miernego stopnia niewydolność chodu | 8 |

B. znacznego stopnia

| | |
|--|----|
| 1. następstwa uszkodzeń (np. urazów skrętnych) dające dolegliwości subiektywne, przykurcze oraz skrócenie 2-4 cm, ale z ustawieniem biodra w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalającej na w miarę sprawny chód | 12 |
| 2. następstwa uszkodzeń (np. urazów skrętnych) dające znaczne dolegliwości subiektywne, przykurcze, skrócenie powyżej 4 cm, ustawienie biodra w pozycji czynnościowo korzystnej, z zaburzeniami mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych i kolana | 18 |
| 3. zeszywniałe i bolesne biodro, ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej powodujące zaburzenia mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych i kolana | 24 |

145. Zeszywnienie stawu biodrowego – w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki

A. w ustawieniu czynnościowo korzystnym (zgięcia 15°-20°, odwiedzenia 5°-10° i rotacji zewnętrznej 5°-10°)

| | |
|---|----|
| 1. zeszywniałe, niebolesne biodro, ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej, pozwalającej na w miarę sprawny chód | 16 |
| 2. zeszywniałe, niebolesne biodro, ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej, pozwalające na w miarę sprawny chód, z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana, stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa | 20 |

| | |
|---|----|
| 3. zeszywniałe, bolesne biodro, ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód | 26 |
| 4. zeszywniałe, bolesne biodro, ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa | 32 |

B. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym (przywiedzenia i rotacji wewnętrznej)

| | |
|--|----|
| 1. zeszywniałe, niebolesne biodro, ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej, i pozwalające na w miarę sprawny chód | 36 |
| 2. zeszywniałe, bolesne biodro ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej, upośledzające sprawność chodu, z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa | 42 |
| 3. zeszywniałe biodro, dające stały ból, powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana, stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa | 55 |

146. Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego (zwichnięć, złamań bliższej nasady kości udowej, złamań szyjki, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych, złamań krętarzy, urazowych złuszczeń głowy kości udowej itp.) – w zależności od zakresu ruchów, przemieszczeń, skrócenia kończyny, zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych oraz dolegliwości subiektywnych:

A. miernego stopnia

| | |
|---|----|
| 1. następstwa uszkodzeń wygojonych, bez skrócenia, dających dolegliwości subiektywne, ale ze sprawnym i wydolnym mechanizmem chodu | 8 |
| 2. następstwa uszkodzeń wygojonych, ze skróceniem do 2 cm, dających dolegliwości subiektywne, ograniczające ruchomość pozwalające na zgięcie powyżej 90°, sprawne odwiedzenie i ruchy rotacyjne | 12 |
| 3. następstwa uszkodzeń wygojonych, ze skróceniem 2 do 4 cm, dających dolegliwości subiektywne, ograniczające ruchomość poniżej zgięcia 90°, odwiedzenia poniżej 15° i ruchów rotacyjnych poniżej 15° | 16 |

Uwaga: Ograniczenia ruchomości do zakresu zgięcia <45°, ze śladem ruchów odwodzenia i rotacji należy oceniać jak zeszywnienie patrz pkt.145A

B. dużego stopnia

| | |
|---|----|
| 1. prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego (zgięcie 90°, odwiedzenie 15° i zachowane rotacje) i pozwalająca na w miarę sprawny chód | 22 |
| 2. prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego, z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa | 26 |

3. następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne, w tym ograniczenia zakresu ruchomości bez możliwości zgięcia biodra do kąta 90° lub/i skrócenie kończyny powyżej 4-6 cm 32

4. następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne, w tym znaczne ograniczenia zakresu ruchomości, skrócenie powyżej 6 cm z zachowaną jeszcze funkcją podporową kończyny jedynie po zaopatrzeniu w obuwie ortopedyczne 36

C. z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano itp.)

1. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny, dające stały ból oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana, stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa, w tym obluźnianie endoprotezy, stawy rzekome szyjki kości udowej oraz okolicy krętarzowej 42

2. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny, dające stały ból oraz wtórne dolegliwości, w tym brak zrostu po wielokrotnie operowanych stawach rzekomych szyjki kości udowej i okolicy krętarzowej 50

3. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny, w tym powikłania w postaci niestabilności endoprotezy (wielokrotne zwichanie się endoprotezy) lub tzw. "biodro wiszące" 60

147. Powikłane przewlekłe zapalenie tkanki kostnej, z przetokami, orzeka się wg. pozycji 143-146, zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od rozmiarów powikłań o

- A.**
- | | |
|-------------------------------|----|
| 1. przewlekłe zapalenie kości | +5 |
| 2. przetoki | +5 |
| 3. zmiany troficzne | +5 |

Uwaga: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostna – stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zaburzenia statyki.

Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną uwagę zwracać na istnienie związku przyczynowego między zgłaszanymi schorzeniami a wypadkiem

Udo

148. Złamanie kości udowej – w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych

- A. niewielkie zmiany**
- | | |
|---|---|
| 1. niewielkie zmiany w postaci blizn i dolegliwości subiektywnych | 2 |
|---|---|

2. niewielkie zmiany w postaci blizn, nieznacznych zaników mięśni uda, bez skrócenia kończyny, z prawidłowymi zakresami ruchomości kolana lub biodra 4

3. niewielkie zmiany w postaci blizn, zaników mięśni uda do 2 cm mierzonych 10 cm ponad ręką, z zagięciem osi lub skróceniem do 2 cm, z niewielkimi ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra 8

4. niewielkie zmiany w postaci blizn, znacznych zaników mięśni uda powyżej 2 cm, z zagięciem osi lub skróceniem do 4 cm, z ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra i z nieznaczną niewydolnością chodu 12

B. średnie zmiany lub skrócenie 4-6 cm

1. średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące mierne upośledzenie mechanizmu chodu 16

2. średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące upośledzenie mechanizmu chodu 18

3. średnie zmiany ze skróceniem do 6 cm lub powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu 26

C. duże zmiany, lub skrócenie ponad 6 cm

1. duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm, powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu 32

2. duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm, powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo niekorzystnych i upośledzające mechanizm chodu 36

149. Staw rzekomy kości udowej, ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążanie kończyny, opóźniony zrost kości – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych

- A.**
- | | |
|--|----|
| 1. staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie do 4 cm lub powodujący przykurcz kolana lub biodra w pozycji czynnościowo niekorzystnej | 42 |
| 2. staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie od 4 do 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny | 48 |
| 3. zakażony staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie ponad 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny | 56 |

150. Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) – w zależności od zaburzeń funkcji

- A. miernego stopnia**
- | | |
|---|---|
| 1. niewielkie zmiany miejscowe dające dolegliwości subiektywne | 1 |
| 2. następstwa uszkodzeń wygojonych bez przykurczów, dających subiektywne dolegliwości oraz zachowujące wydolny chód | 4 |

3. następstwa uszkodzeń wygojonych z niewielkim przykurczem powodującym skrócenie do 2 cm, dających dolegliwości subiektywne i miernego stopnia niewydolność chodu. 8

B. znacznego stopnia

1 następstwa uszkodzeń dające dolegliwości subiektywne i przykurcze ze skróceniem 2-4 cm z ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące niewydolność chodu 12

2. następstwa uszkodzeń dające znaczne dolegliwości subiektywne, ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące znaczną niewydolność chodu 16

151. Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe – w zależności od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych

A.

1. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych goleni, wygojone z zakrzepicą nie obejmującą naczyń głównych, oraz uszkodzenia naczyń tętniczych wygojone z niewielkimi miejscowymi następstwami 8

2. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych, wygojone z zakrzepicą żyły udowej lub uszkodzenia naczyń tętniczych skutkujące zeszywnieniem stawu skokowego 16

3. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych powodujące zakrzepicę żyły piszczelowej skutkującą zeszywnieniem, zmianami miejscowymi, dające niewydolność chodu lub utrzymujący się tętniak rzekomy dużego naczynia 24

152. Powikłane uszkodzenia uda ocenia się wg poz.148-151, zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od rozmiarów powikłań o

A.

1. przewlekłe ropne zapalenie kości +2

2. przetoki +2

3. ciała obce +2

4. skostnienie pozaszkieletowe +2

5. zmiany neurologiczne +2

153. Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg. poz.148-151 zwiększając stopień trwałego uszczerbku – w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o

A.

1. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym +5

2. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym +5

3. zniesienie ruchów stopy +20

4. upośledzenie ruchów stopy +10

5. zaburzenia czucia +5

6. zmiany troficzne bardzo nasilone +5

7. zmiany troficzne miernie nasilone +3

8. kaulalgia +20

Uwaga: Łączny stopień uszczerbku ocenianego wg. pozycji 148-151 i poz.153 nie może przekroczyć 70%

max 70

154. Utrata kończyny – w zależności od długości kikuta i przydatności do zaprotezowania

A.

1. kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznych dający możliwości protezowania 50

2. kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi ograniczający możliwości protezowania 60

3. kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi lub z przetokami praktycznie uniemożliwiający protezowanie 70

Staw kolanowy

155. Złamanie nasad tworzących staw kolanowy i rzepki – w zależności od zniekształceń, szpotawości, koślawości, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu, zaburzeń statyczno-dynamicznych kończyny i innych zmian (norma zakresu ruchu wynosi od -5° do 120°-150°, pomiar obwodu uda wykonuje się na wysokości 10 cm ponad rzepką)

A. niewielkie zmiany

1. następstwa złamań powodujące subiektywne dolegliwości stawu, z niewielkimi zanikami mięśni uda, bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 4

2. następstwa złamań z objawami wyraźnej niewydolności stawu kolanowego, z nawracającymi wysiękami kolana, objawami tarcia w stawie, z zanikami mięśni uda do 2 cm, z ubytkiem zakresu ruchomości do 30° 8

B. średnie zmiany

1. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności, z nawracającymi wysiękami kolana, z objawami tarcia w stawie, z zanikami mięśni uda do 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° 12

2. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności, z nawracającymi wysiękami kolana, z objawami tarcia w stawie, z zanikami mięśni uda ponad 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana od 45° i zgięcia powyżej 90°, oraz patellektomia 16

3. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu zanikami mięśni do 4 cm i zeszywnienie kolana w pozycji czynnościowo korzystnej 20

C. duże zmiany (zeszywnienia w niekorzystnym ustawieniu, brak stabilności stawu)

1. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana, tarcia w stawie i niestabilności stawu, powodującej stałe "uciekanie kolana" z koniecznością stosowania stabilizatora stawu, z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zeszywnienie w pozycji maksymalnego wyprostu lub zgięcia powyżej 30° 25

2. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana, tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego, że wymaga stałego stosowania stabilizatora 35

| | |
|---|----|
| 3. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana, tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego, że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kul | 40 |
|---|----|

156. Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego (torebki, więzadeł, łąkotec)

w zależności od ograniczenia ruchów, stabilności stawu, wydolności statyczno-dynamicznej kończyny

A. niewielkie zmiany

| | |
|---|---|
| 1. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotec powodujące subiektywne dolegliwości, z niewielkimi zanikami mięśni uda, bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana | 4 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 2. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotec z objawami wyraźnej niestabilności stawu kolanowego, z nawracającymi wysiękami kolana, w tym niewydolność więzadła krzyżowego przedniego, z zanikami mięśni uda do 2 cm, z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana nie przekraczającymi 30° | 8 |
|---|---|

B. średnie zmiany

| | |
|---|----|
| 1. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotec z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego, w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego, z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° i z zanikami mięśni uda ponad 2 cm. | 12 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| 2. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotec z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego, w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego, z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytki zakresu ruchomości kolana do 45° i ograniczeniami zgięcia powyżej 90° | 16 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| 3. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotec z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego, w tym jednoczesny brak funkcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego, z zanikami mięśni do 4 cm lub ograniczenia zakresu wyprustu kolana utrudniające poruszanie się | 20 |
|---|----|

C. duże zmiany

| | |
|---|----|
| 1. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotec z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego, powodującej stałe "uciekanie kolana", z koniecznością stosowania stabilizatora stawu, z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zeszczywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. | 25 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 2. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotec z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego, że wymaga stosowania stabilizatora na stałe | 35 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 3. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotec z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego, że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kul | 40 |
|---|----|

157. Inne uszkodzenia stawu kolanowego (blizny skóry, ciała obce) – w zależności

od dolegliwości obrzęków, przewlekłych stanów zapalnych, przetok i innych zmian wtórnych

A. niewielkie zmiany

| | |
|--|---|
| 1. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu | 1 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 2. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu, z niewielkimi zanikami mięśni uda, bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana | 4 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| 3. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego z objawami mającymi wyraźny wpływ na wydolność stawu kolanowego, oraz nawracające wysięki kolana, z zanikami mięśni uda do 2 cm mierzonymi 10 cm powyżej rzepki, z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana | 8 |
|--|---|

B. duże zmiany

| | |
|--|----|
| 1. następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu, powodujące ubytek zakresu ruchomości kolana od 20° do 45° i zgięcia powyżej 100°, z zanikami mięśni uda ponad 2 cm | 12 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| 2. następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytek zakresu ruchomości kolana do 45°, z ograniczeniami zgięcia powyżej 100° i z zanikami mięśni uda ponad 4 cm | 16 |
|---|----|

158. Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego

A.

| | |
|----|----|
| 1. | 65 |
|----|----|

Podudzie

159. Złamanie kości podudzia – w zależności od zniekształceń, przemieszczeń,

powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.

A. zmiany niewielkie lub skrócenie do 4 cm

| | |
|--|---|
| 1. następstwa prawidłowo wygojonych złamań, z zachowaną osią i długością kończyny, bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi | 4 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| 2. następstwa prawidłowo wygojonych złamań, z zachowaną osią, ze skróceniem do 2 cm, bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego, z ograniczeniem ruchów stawu skokowego, głównie zgięcia grzbietowego do 10° oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi | 8 |
|---|---|

| | |
|--|----|
| 3. następstwa wygojonych złamań, z niewielkim zagięciem osi kończyny ze skróceniem od 2 do 4 cm, z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego, stawu skokowego do 10° zgięcia grzbietowego i 25° zgięcia podeszwowego i upośledzające chód w stopniu nieznacznym | 12 |
|--|----|

B. znaczne zmiany, lub skrócenie 4-6 cm

| | |
|---|----|
| 1. następstwa wygojonych złamań, z zagięciem osi kończyny ze skróceniem 4-5 cm, z zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i kolanowego upośledzającymi chód | 16 |
| 2. następstwa wygojonych złamań, ze znacznym zagięciem osi kończyny, ze skróceniem 5-6 cm, z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego na pograniczu jego zeszywnienia oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym | 24 |
| 3. następstwa wygojonych złamań, ze znacznym, przede wszystkim szpotawym zagięciem osi kończyny ze skróceniem > 6 cm, z zeszywnieniem stawu skokowego oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym, wymagającym stosowania kul lub lasek | 28 |

C. bardzo rozległe zmiany powikłane przewlekłym zapaleniem kości, z przetokami, martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi i innymi wtórnymi zmianami

| | |
|---|----|
| 1. staw rzekomy goleni umożliwiający obciążanie w aparacie ortopedycznym i chodzenie o kulach lub zrost złamania powikłanego zapaleniem kości | 30 |
| 2. staw rzekomy goleni powikłany dużymi zmianami troficznymi, z wygojonym zapaleniem kości | 40 |
| 3. zakażony staw rzekomy goleni z przetokami, z dużymi zmianami miejscowymi z zeszywnieniem stawu skokowego | 50 |

160. Izolowane złamanie strzałki – powodujące zniekształcenie i/lub upośledzenie

funkcji kończyny

| | |
|----|---|
| A. | |
| 1. | 3 |

Uwaga: następstwa złamań kostki bocznej określa się według kryteriów przyjętych dla stawu skokowego.

161. Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, ścięgna Achillesa i innych

ścięgien – w zależności od rozległości uszkodzenia, zniekształcenia stopy i ograniczeń czynnościowych, zmian naczyniowych, troficznymi i innych

A. niewielkie zmiany

| | |
|---|---|
| 1. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich, z ewentualnymi niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi | 1 |
| 2. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich, z ubytkiem zakresu ruchu do 30°, z dolegliwościami subiektywnymi | 4 |
| 3. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego, z ograniczeniem ruchów stawu skokowego, głównie zgięcia grzbietowego do 10° upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym, ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi | 8 |

B. znaczne zmiany

| | |
|--|----|
| 1. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego z ubytkiem zakresu ruchu do 45°, z ograniczeniem ruchów stawu skokowego, w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podszwowego, upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym | 12 |
| 2. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry, ale wygojonych, ze zmianami troficznymi, z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego, z ubytkiem zakresu ruchu do 60°, z zeszywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo korzystnej, upośledzającymi chód w stopniu znacznym | 16 |
| 3. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry, wygojonych z ubytkami skóry, z czynnymi przetokami, z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego, z zeszywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej, i upośledzającymi chód w stopniu znacznym | 20 |

162. Utrata kończyny w obrębie podudzia – w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do zaprotezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny

A.

| | |
|---|----|
| 1. przy długości kikuta u osoby dorosłej do 8 cm (mierząc od szpary stawowej) | 60 |
| B. przy kikutach dłuższych niż 8 cm (mierząc od szpary stawowej) | |
| 1. kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznymi dający możliwości protezowania | 40 |
| 2. kikut pokryty skórą, ze zmianami troficznymi ograniczającymi możliwości protezowania | 50 |
| 3. kikut pokryty skórą, ze zmianami troficznymi lub z przetokami trudny do protezowania | 55 |

Staw skokowo-goleniowy i skokowo-piętowy

163. Uszkodzenia stawów skokowo-goleniowego i skokowo-piętowego, skręcenia,

zwichnięcia, złamania, stłuczenia i inne zranienia – w zależności od blizn, zniekształceń, ograniczeń ruchomości, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy, obręzków przewlekłych i utrzymujących się dolegliwości

A. niewielkiego stopnia

| | |
|--|---|
| 1. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego, bez zaburzeń ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi | 1 |
| 2. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego, z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi | 4 |

B. średniego stopnia

| | |
|--|---|
| 1. następstwa wygojonych uszkodzeń stawu skokowego z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego, w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podszwowego upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym, ale ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi | 8 |
|--|---|

C. dużego stopnia

| | |
|--|----|
| 1. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego, zbliżonym do zeszywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej, w ustawieniu pośrednim, w niewielkim zgięciu podszwowym, zapewniające w miarę wydolny chód | 12 |
| 2. następstwa uszkodzeń dających zeszywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podszwowego lub grzbietowego i powodujące dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód | 16 |
| 3. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonych z zeszywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej, i upośledzającymi chód w stopniu znacznym, zmuszające do posługiwania się kulą lub laską | 20 |

D. powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami, martwicą, zmianami troficznymi

| | |
|--|----|
| 1. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z przetokami lub znacznymi zmianami troficznymi i z zeszywnieniem stawu skokowego w pozycji nadmiernego zgięcia podszwowego lub grzbietowego, lub z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską | 28 |
| 2. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym ze znacznymi zmianami i powodujące zeszywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podszwowego lub grzbietowego, oraz z nadmierną utrwaloną supinacją lub pronacją stopy oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania się kulą lub laską, przy współistniejących zmianach troficznymi, przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwiu ortopedycznym | 32 |
| 3. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z zeszywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki, zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) | 38 |

164. Zeszywnienie stawów skokowo-goleniowego lub skokowo-piętowego, w zależności od zniekształceń ustawienia stopy, zmian wtórnych i innych powikłań

A. pod kątem zbliżonym do prostego

| | |
|---|----|
| 1. zeszywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej, w ustawieniu pośrednim, w niewielkim zgięciu podszwowym, zapewniające wydolny chód | 12 |
| 2. zeszywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej, w ustawieniu pośrednim, w niewielkim zgięciu podszwowym, dające dolegliwości podczas chodzenia | 16 |

B. w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych

| | |
|---|----|
| 1. zeszywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podszwowego lub grzbietowego dające dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz niewydolność chodu. | 20 |
| 2. zeszywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podszwowego lub grzbietowego, z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską | 26 |
| C. w ustawieniach niekorzystnych z dużymi zmianami i powikłaniami | |
| 1. zeszywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podszwowego lub grzbietowego, z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską, przy współistniejących zmianach troficznymi, przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwiu ortopedycznym | 32 |
| 2. zeszywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki, zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) | 36 |

165. Złamania kości skokowej lub piętowej – w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno-dynamicznych, zmian troficznymi i innych powikłań

A. niewielkie zmiany

| | |
|--|---|
| 1. następstwa wygojonych złamań z dolegliwościami subiektywnymi | 1 |
| 2. następstwa wygojonych złamań, z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego, i z dolegliwościami subiektywnymi | 4 |
| 3. następstwa wygojonych złamań z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego, głównie zgięcia grzbietowego upośledzającymi chód w stopniu niezacznym, ze zmianami w obrębie stawu skokowo-piętowego oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi | 8 |

B. średnie zmiany

| | |
|---|----|
| 1. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego, zbliżonym do zeszywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej, w ustawieniu pośrednim, z dużymi zmianami wtórными w stawie skokowo-piętowym zapewniające wydolny, ale upośledzony chód | 12 |
| 2. następstwa uszkodzeń dających zeszywnienie w pozycji pośredniej z dużymi zmianami wtórными w stawie skokowo-piętowym i powodujące znaczne dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód | 16 |

C. duże zmiany z częściową utratą kości

| | |
|--|----|
| 1. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym, wygojonych z zeszywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej, z dużymi zmianami wtórными w stawie skokowo-piętowym i upośledzającymi chód w stopniu znacznym, zmuszające do posługiwania się kulą lub laską | 20 |
| 2. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym, wygojonych ze znacznymi zmianami i powodujące zeszywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podszwowego lub grzbietowego, oraz z nadmierną supinacją lub pronacją stopy, oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania | |

| | |
|--|----|
| się kulą lub laską przy współistniejących zmianach troficznych, przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwiu ortopedyczne | 28 |
|--|----|

166. Utrata kości skokowej lub piętowej – w zależności od utrzymujących się dolegliwości, przemieszczeń, zniekształceń ustawienia stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy

A.

| | |
|--|----|
| 1. następstwa uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego i z dużymi zmianami wtórnymi lub z zeszywnieniem w pozycji czynnościowo korzystnej, w ustawieniu pośrednim, umożliwiające zaopatrzenie w obuwiu ortopedyczne, z możliwością obciążania kończyny | 32 |
| 2. następstwa uszkodzeń z dużymi zmianami wtórnymi lub z zeszywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej, bez możliwości zaopatrzenia w obuwiu ortopedyczne i bez możliwości obciążania kończyny | 36 |

167. Uszkodzenia kości stępu z przemieszczeniami, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi – w zależności od wielkości zaburzeń czynnościowych

A. miernego stopnia

| | |
|--|---|
| 1. następstwa uszkodzeń, z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi | 1 |
| 2. następstwa uszkodzeń, z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki stępu i z dolegliwościami subiektywnymi | 4 |
| 3. następstwa uszkodzeń z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki stępu upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym, ze zmianami wtórnymi w obrębie stawów stępu i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi | 8 |

B. znacznego stopnia lub innymi powikłaniami

| | |
|---|----|
| 1. następstwa uszkodzeń wygojonych z wtórną deformacją utrudniającą chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego | 12 |
| 2. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym, wygojonych z wtórną deformacją, zmianami troficznymi oraz z przetokami i utrudniające chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego | 16 |

168. Złamania kości śródstopia – w zależności od zniekształceń i zaburzeń statyczno-dynamicznych oraz innych zmian

A. I lub V kości śródstopia

| | |
|---|----|
| 1. następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi | 1 |
| 2. następstwa uszkodzeń, najczęściej złamań bez przemieszczeń, z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki, głównie z dolegliwościami subiektywnymi | 2 |
| 3. następstwa uszkodzeń, najczęściej złamań z przemieszczeniami, z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki, upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi | 8 |
| 4. następstwa złamań z przemieszczeniem I i V kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwiu ortopedyczne | 12 |

B. II, III i IV kości śródstopia

| | |
|--|---|
| 1. następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi | 1 |
| 2. następstwa uszkodzeń, najczęściej złamań bez przemieszczeń, z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki, głównie z dolegliwościami subiektywnymi | 2 |
| 3. następstwa uszkodzeń, najczęściej złamań z przemieszczeniami, z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi | 8 |

C. złamania trzech i więcej kości śródstopia – w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych

| | |
|--|----|
| 1. następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia powodujące deformację dającą i zaburzenia wydolności chodu | 12 |
| 2. następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwiu ortopedyczne | 16 |

169. Powikłane złamania kości śródstopia – ocenia się wg. poz. 168, zwiększając stopień uszczerbku – w zależności od powikłań o

A.

| | |
|----------------------------|----|
| 1. zapalenie kości, | +2 |
| 2. przetoki | +2 |
| 3. wtórne zmiany troficzne | +2 |
| 4. zmiany neurologiczne | +2 |

170. Inne uszkodzenia stopy w zależności od dolegliwości blizn, zniekształceń, zmian troficznych zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych

A. zmiany niewielkie

| | |
|--|---|
| 1. następstwa wygojonych uszkodzeń z niewielkimi zaburzeniami statyki ruchomości palców oraz głównie z dolegliwościami subiektywnymi | 4 |
|--|---|

B. duże zmiany

| | |
|---|----|
| 1. następstwa uszkodzeń, z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi | 8 |
| 2. następstwa uszkodzeń, z dużymi zmianami troficznymi oraz istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu znacznym i wymagające zaopatrzenia w obuwiu ortopedyczne | 12 |

171. Utrata stopy w całości

A.

| | |
|----|----|
| 1. | 50 |
|----|----|

172. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta

A.

| | |
|----|----|
| 1. | 40 |
|----|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| 173. Utrata stopy w stawie Lisfranca | |
| A. | |
| 1. | 30 |

| | |
|--|----|
| 174. Utrata stopy w obrębie kości śródstopia | |
| A. | |
| 1. | 25 |

Palce stopy

| | |
|--|----|
| 175. Uszkodzenia palucha – w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, charakteru kikuta zaburzeń statyki i chodu i innych zmian wtórnych | |
| A. | |
| 1. ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha | 4 |
| 2. utrata paliczka paznokciowego palucha | 8 |
| 3. utrata całego palucha | 12 |

| | |
|---|---|
| 176. Inne uszkodzenia palucha – w zależności od rozległości uszkodzenia (części miękkich) | |
| A. | |
| 1. niewielkie zmiany | 1 |
| 2. średnie zmiany | 3 |
| 3. duże zmiany | 5 |

| | |
|---|----|
| 177. Utrata palucha wraz z kością śródstopia – w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia | |
| A. | |
| 1. utrata palucha z części kości śródstopia | 16 |
| 2. utrata palucha z całą kością śródstopia | 20 |
| 3. utrata palucha z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód | 25 |

| | |
|---|---|
| 178. Uszkodzenia i ubytki w zakresie palców II, III, IV i V łącznie | |
| A. | |
| 1. częściowa utrata, niewielkie zmiany | 1 |
| 2. częściowa utrata, znaczne zmiany | 2 |
| 3. całkowita utrata, duże zmiany | 4 |

| | |
|--|----|
| 179. Utrata palca V wraz z kością śródstopia | |
| A. | |
| 1. utrata palca V z części kości śródstopia | 5 |
| 2. utrata palca V z całą kością śródstopia | 10 |
| 3. utrata palca małego z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód | 15 |

| | |
|--|---|
| 180. Utrata palców II, III, IV wraz z kością śródstopia | |
| A. | |
| 1. utrata palców z części kości śródstopia | 2 |
| 2. utrata palców z całą kością śródstopia | 4 |
| 3. utrata palców z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód | 8 |

| | |
|---|---|
| 181. Inne drobne uszkodzenia i zniekształcenia palców | |
| A. | |
| 1. | 1 |

Uwaga: Uszkodzenia kikuta amputowanych kończyn wymagające reamputacji lub uniemożliwiające zastosowanie protezy oceniać należy wg amputacji na poziomie wyższym, zaś wymagające reamputacji należy oceniać podobnie odejmując procent uszczerbku za kikut istniejący przed urazem

N. PORAZENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH

| | | | |
|--|--|-------|------|
| 182. Uszkodzenie częściowe lub całkowite – w zależności od stopnia zaburzeń: | | prawa | lewa |
| A. | | | |
| 1. nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym | | 8 | 8 |
| B. | | | |
| 1. nerwu piersiowego długiego | | 10 | 8 |
| C. nerwu pachowego | | | |
| 1. częściowe – czuciowe | | 10 | 8 |
| 2. całkowite – ruchowe i/lub czuciowe | | 20 | 16 |
| D. nerwu mięśniowo-skórnego | | | |
| 1. częściowe – czuciowe | | 8 | 4 |
| 2. całkowite | | 20 | 16 |
| E. nerwu promieniowego | | | |
| 1. upośledzenie prostowania przedramienia | | +3 | +2 |
| 2. upośledzenie odwracania przedramienia | | +3 | +2 |
| 3. upośledzenie prostowania ręki | | +10 | +8 |
| 4. osłabienie zginania przedramienia | | +3 | +2 |
| 5. upośledzenie prostowania i odwodzenia kciuka | | +10 | +8 |
| 6. upośledzenie prostowania w stawach śródrečno-paliczkowych | | +6 | +4 |
| 7. osłabienie przywodzenia ręki | | +4 | +3 |
| 8. osłabienie odwodzenia ręki | | +4 | +3 |
| 9. zaburzenia czucia | | +3 | +1 |

| | | |
|---|-----|-----|
| F. nerwu pośrodkowego | | |
| 1. upośledzenie czynnego nawracania przedramienia | +4 | +2 |
| 2. upośledzenie zginania ręki | +4 | +2 |
| 3. upośledzenie zginania palców | +4 | +2 |
| 4. upośledzenie ruchów kciuka (niemożność przeciwwstawiania i zginania) | +10 | +8 |
| 5. zaburzenia czucia | +5 | +4 |
| 6. zaburzenia wegetatywne (naczynioruchowe lub troficzne) | +5 | +4 |
| G. nerwu łokciowego | | |
| 1. częściowe – czuciowe | 5 | 3 |
| 2. częściowe – ruchowe | 15 | 10 |
| 3. częściowe – czuciowe i ruchowe | 20 | 15 |
| 4. całkowite | 30 | 20 |
| H. splotu barkowego | | |
| 1. upośledzenie odwodzenia ramienia | +5 | +4 |
| 2. upośledzenie zginania w stawie łokciowym | +5 | +4 |
| 3. upośledzenie odwracania przedramienia | +5 | +4 |
| 4. porażenie zginaczy i prostowników przedramienia | +5 | +4 |
| 5. porażenie mięśni ręki | +20 | +15 |
| 6. zaburzenia czucia | +5 | +5 |
| I. pozostałych nerwów odcinka szyjno – piersiowego | | |
| czuciowe | | 7 |
| całkowite – ruchowe i/lub czuciowe | | 12 |
| J. nerwu zasłonowego | | 12 |
| K. nerwu udowego | | 20 |
| L. nerwów pośladkowych (górnego i dolnego) | | 10 |
| M. nerwu sromowego wspólnego | | 15 |
| N. nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy | | |
| 1. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym | +5 | |
| 2. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym | +5 | |
| 3. zniesienie ruchów stopy | +30 | |
| 4. upośledzenie ruchów stopy | +15 | |
| 5. zaburzenia czucia | +5 | |
| 6. zmiany troficzne bardzo nasilone | +10 | |
| 7. zmiany troficzne miernie nasilone | +5 | |
| 8. kaulgalgia | +10 | |

Uwaga: W przypadkach uszkodzeń częściowych należy oceniać wg. objawów dotyczących gałęzi nerwu i nie może on przekroczyć norm przewidzianych poniżej.

| | | |
|--|--|-----|
| O. nerwu piszczelowego | | |
| 1. brak zgięcia podszwowego stopy i palców | | +20 |
| 2. upośledzenie zgięcia podszwowego stopy i palców | | +8 |
| 3. zaburzenia czucia | | +5 |
| 4. zmiany troficzne bardzo nasilone | | +10 |
| 5. zmiany troficzne miernie nasilone | | +5 |

| | | |
|---|--|-----|
| P. nerwu strzałkowego | | |
| 1. osłabienie zgięcia podszwowego stopy | | +4 |
| 2. brak możliwości nawracania stopy | | +4 |
| 3. osłabienie zginania i prostowania palców | | +3 |
| 4. zaburzenia czucia | | +10 |
| R. splotu lędźwiowo-krzyżowego | | |
| 1. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym | | +10 |
| 2. upośledzenie zginania i prostowania w stawie biodrowym | | +10 |
| 3. upośledzenie przywodzenia uda | | +10 |
| 4. zniesienia ruchów stawu kolanowego | | +10 |
| 5. zniesienie ruchów stopy | | +10 |
| 6. zaburzenia czucia | | +10 |
| 7. zmiany troficzne | | +10 |
| S. | | |
| 1. pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego | | 8 |

Uwagi:

Wg.poz.182 ocenia się tylko izolowane uszkodzenia nerwów obwodowych.

Współistniejące uszkodzenia kostne, mięśniowe i nerwowe ocenia się wg pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyn górnych i dolnych.

Uszkodzenia nerwów obwodowych powinny być udokumentowane badaniem neurofizjologicznym (emg i neuroprzewodnictwo). Uszkodzenia całkowite muszą zostać udokumentowane badaniem neurofizjologicznym (emg i neuroprzewodnictwo).

W ocenie następstw uszkodzeń nerwów obwodowych następstwa nie mogą przekraczać uszczerbków przewidzianych dla amputacji na poziomie odpowiadającym zakresowi unerwienia.

183.Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną

| | | |
|------------------------------|----|----|
| A. | | |
| 1. w obrębie kończyny górnej | 50 | 30 |
| 2. w obrębie kończyny dolnej | 40 | 40 |

